

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1996 | Nagai K., Y. Matsuyama, and T. Uchida. | 1998 | ヘテロカプサ | Ptential transfer of <i>Heterocapsa circularisqama</i> with pearl oyster consignments. In "Harmful Algae"(ed. By Reguera B., Blanco J., Fernandez M. L., And Wyatt T.). | Xunta de Galicia and IOC of UNESCO, 224–226. | <i>Heterocapsa</i> |
| 1997 | Nagai K., Y. Matsuyama, T. Uchida, S. Akamatsu, and T. Honjo. | 2000 | ヘテロカプサ | Effect of a natural population of the harmful dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> on the survival of the pearl oyster <i>Pinctada fucata</i> . | Fisheries Science, 66(5), 995–997. | dinoflagellate/ <i>Heterocapsa circularisquama</i> /mortality/pearl oyster/ <i>Pinctada fucata</i> /red tide |
| 1998 | 長井 敏・森 俊朗. | 1998 | その他 | 水産物の一夜干しおよびベニズワイガニむき身中の生菌数測定における誤差範囲の推定について. | 兵庫県立水産試験場研究報告, 34, 31–35. | 生菌数/分析誤差/水産加工品 |
| 1999 | 長井 敏・森 俊朗. | 1998 | その他 | 暗所におけるゆでダコの発光現象について. | 兵庫県立水産試験場研究報告, 34, 49–54. | ゆでダコ/発光細菌/ <i>Photobacterium</i> sp. |
| 2000 | 永井清仁・岡田昌樹・船越将二・本城凡夫. | 2000 | アコヤガイ | 感染症によるアコヤガイ大量へい死への対処 へい死の軽減または防止方策としての低水温漁場を用いた越冬の効果. | 真珠の雑誌, 45, 1–48. | 防止方策, 水温漁場, 効果, 感染症, 軽減, 越冬, へい死, 対処, へい死 |
| 2001 | 永井清仁・岡田昌樹・郷 譲治・瀬川 進・本城凡夫. | 2002 | アコヤガイ | 感染症によるアコヤガイ大量へい死への対処Ⅱ 低水温漁場を用いた越冬効果の検証と再感染の影響について. | 真珠の雑誌, 55, 2–61. | 水温漁場, 越冬効果, 対処, 感染症, 影響, 検証, 感染, へい死 |
| 2002 | Nagai H., M. Satake, M. Murata, and T. Yasumoto. | 1990 | 毒 | Screening of marine phytoplankton for antifungal substances. | Toxic Marine Phytoplankton, 385–390. | 抗カビ物質/植物プランクトン/スクリーニング |
| 2003 | 長井 敏・高瀬博文・増田恵一. | 1996 | 珪藻 | 1995年冬期、兵庫県下のノリ養殖漁場に大発生した付着珪藻 <i>Tabularia affinis</i> について. | 兵庫県立水産試験場研究報告, 33, 19–26. | <i>affinis</i> , ノリ養殖漁場, 兵庫, 下, <i>tabularia</i> , 付着珪藻 <i>Tabularia affinis</i> |
| 2004 | 永井清仁・山下裕康・郷 譲治・岡野晴樹・端野幸輔・本城凡夫. | 2004 | ヘテロカプサ | 海の異変を知らせる貝リンガル. | 養殖, 29, 82–85. | 異変, 海, 貝リンガル |
| 2005 | Nagamori E., H. Honda, T. Hanai, K. Nakanishi, N. Hata, T. Masuda, and T. Kobayashi. | 2001 | ヘテロカプサ | Prediction of occurrence of <i>Heterocapsa circularisquama</i> red tide by means of fuzzy neural network. | Journal of Chemical Engineering of Japan, 34(8), 998–1005. | Red Tide/ <i>Heterocapsa</i> /Prediction/Fuzzy Neural Network/Modeling |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 | 長崎慶三. | 1994 | ヘテロシグマ・赤潮一般 | ウイルスによる <i>Heterosigma</i> 殺滅. | 赤潮と微生物－環境に優しい微生物農薬を求めて－(石田祐三郎・菅原 聰編), 恒星社厚生閣, 110-119. | ウイルス, heterosigma, 滅 |
| 2007 | 長崎慶三. | 1998 | 赤潮一般 | 殺藻性ウイルスによる赤潮防除の可能性. | Microbes and Environments, 13(2), 109-113. | 赤潮防除, 可能性, 藻性ウイルス |
| 2008 | Nagasaki K. | 2001 | ヘテロカプサ | Selective eradication of a shellfish-killing phytoplankton <i>Heterocapsa circularisquama</i> using natural viruses. | Farming Japan, 35(6), 44-46. | Heterocapsa |
| 2009 | Nagasaki K. | 2008 | 赤潮一般 | Dinoflagellates, diatoms, and their viruses. | J. Microbiol., 46(3), 235-243. | algal viruses/dinoflagellate/diatom/ <i>Heterocapsa circularisquama/Rhizosolenia setigera/Chaetoceros</i> spp./HcV/HcRNAV/RsRNAV/CsNIV/CdebDNAV |
| 2010 | Nagasaki K., M. Ando, I. Imai, I. Itakura, and Y. Ishida. | 1994 | ヘテロシグマ | Virus-like particles in <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae): A possible red tide disintegration mechanism. | Marine Biology, 119(2), 307-312. | heterosigma, possible, tide, disintegration, like, red, mechanism, virus-like particles in <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae), a possible red tide disintegration mechanism, virus, raphidophyceae, particles, akashiwo |
| 2011 | Nagasaki K., M. Ando, S. Itakura, I. Imai, and Y. Ishida. | 1994 | ヘテロシグマ | Viral mortality in the final stage of <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae) red tide. | J. Plankton Res., 16(11), 1595-1599. | mortality, final, viral, heterosigma, stage, tide, red, Viral mortality in the final stage of <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae) red tide, raphidophyceae, akashiwo |
| 2012 | Nagasaki K., S. Itakura, I. Imai, S. Nakagiri, and M. Yamaguchi. | 1996 | ヘテロシグマ | The disintegration process of a <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae) red tide in northern Hiroshima Bay, Japan, during the summer of 1994. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 251-254. | <i>Heterosigma akashiwo</i> /広島湾/崩壊 |
| 2013 | Nagasaki K., Y. Shirai, Y. Takao, H. Mizumoto, K. Nishida, and Y. Tomaru. | 2005 | ヘテロカプサ | Comparison of genome sequences of single-stranded RNA viruses infecting the bivalve-killing dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> . | Appl. Environ. Microbiol., 71(12), 8888-8894. | bivalve, comparison, genome, dinoflagellate, heterocapsa, single, stranded, viruses, Comparison of genome sequences of single-stranded RNA viruses infecting the bivalve-killing dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> , rna, infecting, killing, sequences, circularisquama |
| 2014 | Nagasaki K., K. Tarutani, M. Hamaguchi, and M. Yamaguchi. | 2001 | ヘテロシグマ | Preliminary analysis on <i>Heterosigma akashiwo</i> virus DNA. | Microbes and Environments, 16(3), 147-154. | HaV/microalgal virus/ <i>Heterosigma akashiwo</i> /Phycodnaviridae/PCR |
| 2015 | Nagasaki K., K. Tarutani, Y. Tomaru, S. Itakura, K. Tamai, S. Yamanaka, H. Tanabe, N. Katanozaka, Y. Shirai, and M. Yamaguchi. | 2002 | 赤潮一般 | Possible use of viruses as a microbiological agent against harmful algal blooms. | Proceedings of International Commemorative Symposium 70th Anniversary of the Japanese Society of Fisheries Science, 497-500. | possible, algal, microbiological, harmful, agent, viruses, Possible use of viruses as a microbiological agent against harmful algal blooms, blooms, use |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Nagasaki K., K. Tarutani, and M. Yamaguchi. | 1999 | ヘテロシグマ | Growth characteristics of <i>Heterosigma akashiwo</i> virus and its possible use as a microbiological agent for red tide control. | Applied and Environmental Microbiology, 65(3), 898–902. | heterosigma, possible, tide, microbiological, characteristics, Growth characteristics of Heterosigma akashiwo virus and its possible use as a microbiological agent for red tide control, agent, red, use, growth, control, virus, akashiwo |
| 2017 | Nagasaki K., K. Tarutani, and M. Yamaguchi. | 1999 | ヘテロシグマ | Cluster analysis on algicidal activity of HaV clones and virus sensitivity of <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae). | Journal of Plankton Research, 21(11), 2219–2226. | Cluster analysis on algicidal activity of HaV clones and virus sensitivity of Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae), hav, analysis, sensitivity, heterosigma, activity, cluster, virus, raphidophyceae, algicidal, clones, akashiwo |
| 2018 | Nagasaki K., Y. Tomaru, K. Tarutani, N. Katanozaka, S. Yamanaka, H. Tanabe, and M. Yamaguchi. | 2003 | ヘテロカプサ | Growth characteristics and intraspecies host specificity of a large virus infecting the dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> . | Appl. Environ. Microbiol., 69(5), 2580–2586. | intraspecies, specificity, characteristics, dinoflagellate, heterocapsa, Growth characteristics and intraspecies host specificity of a large virus infecting the dinoflagellate Heterocapsa circularisquama, large, infecting, growth, virus, host, circularisquama |
| 2019 | Nagasaki K., A. Uchida, S. Hiroishi, and Y. Ishida. | 1989 | シャットネラ | Identification of red tide algae <i>Chattonella marina</i> and <i>Chattonella antiqua</i> by means of monoclonal antibodies. | Current Topics in Marine Biotechnology, Fuji Technology Press Ltd., 161–164. | chattonella, marina, antibodies, tide, monoclonal, algae, Identification of red tide algae Chattonella marina and Chattonella antiqua by means of monoclonal antibodies, red, identification, means, antiqua |
| 2020 | Nagasaki K., A. Uchida, and Y. Ishida. | 1991 | ミキモトイ | A monoclonal antibody which recognizes the cell surface of red tide alga <i>Gymnodinium nagasakiense</i> . | Nippon Suisan Gakkaishi, 57(6), 1211–1214. | A monoclonal antibody which recognizes the cell surface of red tide alga Gymnodinium nagasakiense, tide, monoclonal, recognizes, alga, surface, red, gymnodinium, antibody, nagasakiense, cell |
| 2021 | Nagasaki K. and M. Yamaguchi. | 1997 | ヘテロシグマ | Isolation of a virus infectious to the harmful bloom causing microalga <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae). | Aquatic Microbial Ecology, 13(2), 135–140. | red tide/harmful algal bloom/lytic virus/ <i>Heterosigma akashiwo</i> /Raphidophyceae/host specificity/HaV |
| 2022 | Nagasaki K. and M. Yamaguchi. | 1998 | ヘテロシグマ | Intra-species host specificity of HaV (<i>Heterosigma akashiwo</i> virus) clones. | Aquatic Microbial Ecology, 14(1), 109–112. | HaV/ <i>Heterosigma akashiwo</i> /Raphidophyceae/harmful algal bloom/red tide/virus/host range |
| 2023 | Nagasaki K. and M. Yamaguchi. | 1998 | ヘテロシグマ | Effect of temperature on the algicidal activity and the stability of HaV (<i>Heterosigma akashiwo</i> virus). | Aquatic Microbial Ecology, 15(3), 211–216. | HaV/ <i>Heterosigma akashiwo</i> /Raphidophyceae/harmful algal bloom/red tide/virus/algicidal activity/infectivity/susceptibility/temperature |
| 2024 | Nagasaki K. and M. Yamaguchi. | 1999 | ヘテロシグマ | Cryopreservation of a virus (HaV) infecting a harmful bloom causing microalga, <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae). | Fisheries Science, 65(2), 319–320. | HaV/ <i>Heterosigma akashiwo</i> /Raphidophyceae/algal virus/cryopreservation/dimethyl sulfoxide/isolation |
| 2025 | 長崎慶三・山口峰生・今井一郎. | 2000 | ヘテロカプサ | 英虞湾から分離された海洋細菌 AA8-2株の <i>Heterocapsa circularisquama</i> に対する殺藻性に関する検討. | Nippon Suisan Gakkaishi, 66(4), 666–673. | 赤潮/ <i>Heterocapsa circularisquama</i> /細菌/テンポラリースト/ <i>Cytophaga</i> 属 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | Nagashima Y., O. Arakawa, K. Shiomi, and T. Noguchi. | 1996 | 毒 | Paralytic shellfish toxins in a trumpet shell, <i>Charonia lampas</i> , from Spain. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 425–427. | 貝/PSP/スペイン |
| 2027 | Nagashima Y., T. Noguchi, and K. Hashimoto. | 1989 | 毒 | Analysis of paralytic shellfish poisons, in particular protogonyautoxins, by ion-pairing high performance liquid chromatography. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 427–430. | PSP/プロトゴニオトキシン/毒 |
| 2028 | Nagashima Y., T. Noguchi, T. Kawabata, and K. Hashimoto. | 1990 | 毒 | Improved extraction method for paralytic shellfish poison to be used in mouse bioassay. | Nippon Suisan Gakkaishi, 56(5), 765–770. | shellfish, used, improved, method, poison, paralytic, bioassay, extraction, mouse, Improved extraction method for paralytic shellfish poison to be used in mouse bioassay |
| 2029 | Nagashima Y., T. Noguchi, J. Maruyama, S. Kamimura, and K. Hashimoto. | 1984 | 毒 | Occurrence of paralytic shellfish poisons in an ascidian <i>Holocynthia roretzi</i> . | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(2), 331–334. | holocynthia, shellfish, roretzi, paralytic, occurrence, ascidian, poisons, Occurrence of paralytic shellfish poisons in an ascidian Holocynthia roretzi |
| 2030 | Nagashima Y., H. Ohgoe, K. Yamamoto, K. Shimakura, and K. Shiomi. | 1998 | 毒 | Resistance of non-toxic crabs to paralytic shellfish poisoning toxins. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 604–606. | PSP/毒 |
| 2031 | 長副 聰. | 2006 | ギロディニウム | 渦鞭毛藻 <i>Gyrodinium istriatum</i> の赤潮発生機構に関する研究. | 九州大学学位論文. | 赤潮発生機構, istriatum, gyrodinium, 研究, 渦鞭毛藻 Gyrodinium istriatum |
| 2032 | Nagasoe S., D-I. Kim, Y. Shimasaki, Y. Oshima, M. Yamaguchi, and T. Honjo. | 2006 | ギロディニウム | Effects of temperature, salinity and irradiance on the growth of the red tide dinoflagellate <i>Gyrodinium istriatum</i> Freudenthal et Lee. | Harmful Algae, 5, 20–25. | <i>Gyrodinium istriatum</i> /Temperature/Salinity/Irradiance/Growth rate |
| 2033 | 長副 聰・島崎洋平・松原 賢・紫加田知幸・山崎康裕・吉田幸史・久野勝利・大嶋雄治・本城凡夫. | 2009 | 珪藻 | 有明海奥部、塩田川河口海域における物理・化学的要因と植物プランクトンの増殖との関係. | 沿岸海洋研究, 46, 141–151. | 有明海/珪藻/鞭毛藻/栄養塩供給/全天日射量/河口干潟/貧酸素 |
| 2034 | Nagasoe S., K. Suzuki, T. Yurimoto, R. Fuseya, T. Fukao, T. Yamatogi, K. Kimoto, and Y. Maeno. | 2011 | シャットネラ | Clearance effects of the Pacific oyster <i>Crassostrea gigas</i> on the fish-killing algae <i>Chattonella marina</i> and <i>Chattonella antiqua</i> . | Aquatic Biology, 11, 201–211. | clearance rate/raphidophyte/harmful algae/ <i>Chattonella</i> spp. |
| 2035 | Nagasoe S., S. Toda, Y. Shimasaki, Y. Oshima, T. Uchida, and T. Honjo. | 2006 | ギロディニウム | Growth inhibition of <i>Gyrodinium istriatum</i> (Dinophyceae) by <i>Skeletonema costatum</i> (Bacillariophyceae). | African Journal of Marine Science, 28(2), 325–329. | allelopathy/ <i>Gyrodinium istriatum</i> / <i>Skeletonema costatum</i> / species interaction |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2036 | Nagayama K., T. Shibata, K. Fujimoto, T. Horjo, and T. Nakamura. | 2003 | アレロパシー | Algicidal effect of phlorotannins from the brown alga <i>Ecklonia kurome</i> on red tide microalgae. | Aquaculture, 218, 601–611. | Algicidal effect/Phlorotannin/ <i>Ecklonia kurome</i> /Red tide microalgae/Dinoflagellate |
| 2037 | Naito K., I. Imai, and H. Nakahara. | 2008 | ヘテロカプサ・ヘテロシグマ | Complexation of iron by microbial siderophores and effects of iron chelates on the growth of marine microalgae causing red tide. | Phycological Research, 56, 58–67. | chelate/growth/iron/microalgae/red tide/siderophore |
| 2038 | Naito K., M. Matsui, and I. Imai. | 2005 | 赤潮一般・ヘテロシグマ・シャットネラ・ヘテロカプサ・ミキモトイ | Ability of marine eukaryotic red tide microalgae to utilize insoluble iron. | Harmful Algae, 4, 1021–1032. | Chemically defined artificial medium/Eukaryotic microalgae/Growth/Insoluble iron/Iron uptake mechanism/Red tide |
| 2039 | Naito K., M. Matsui, and I. Imai. | 2005 | シャットネラ | Influence of iron chelation with organic ligands on the growth of red tide phytoplankton. | Plankton Biol. Ecol., 52(1), 14–26. | chelation/growth/organic iron/phytoplankton/red tide |
| 2040 | 中川久幾・佐伯賢三. | 1992 | 環境 | 5種類の海産植物プランクトンの増殖に対する塩化トリブチルスズの影響. | 九大農芸誌, 46(3・4), 231–236. | 海産植物プランクトン, 影響, 増殖, 種類, 塩化トリブチルスズ |
| 2041 | 中原紘之・左子芳彦. | 1987 | 生活環 | 淡水植物プランクトンの生活史. | 淡水赤潮, 門田 元編 恒星社厚生閣版, 21–77. | 淡水植物プランクトン, 生活史 |
| 2042 | 中村 宏. | 1983 | その他 | 貝類学への新しい道をさぐる. | 自然科学と博物館, 50(1), 21–24, 37. | 道, 貝類学 |
| 2043 | Nakamura Y. | 1985 | シャットネラ | Ammonium uptake kinetics and interactions between nitrate and ammonium uptake in <i>Chattonella antiqua</i> . | J. Oceanogr. Soc. Japan, 41, 33–38. | kinetics, chattonella, nitrate, uptake, ammonium, Ammonium uptake kinetics and interactions between nitrate and ammonium uptake in <i>Chattonella antiqua</i> , interactions, antiqua |
| 2044 | Nakamura Y. | 1985 | シャットネラ | Kinetics of nitrogen or phosphorus-limited growth and effects of growth conditions on nutrient uptake in <i>Chattonella antiqua</i> . | J. Oceanogr. Soc. Japan, 41, 381–387. | kinetics, chattonella, conditions, limited, uptake, Kinetics of nitrogen or phosphorus-limited growth and effects of growth conditions on nutrient uptake in <i>Chattonella antiqua</i> , phosphorus, growth, antiqua, nutrient, effects, nitrogen |
| 2045 | 中村 宏. | 1986 | その他 | 原始腹足目の新上科 Neomphalacea. | 貝雑 VENUS, 45(2), 138–140. | 原始腹足目, 上科 Neomphalacea, neomphalacea |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2046 | Nakamura H. K. | 1986 | その他 | Chromosomes of archaeogastropoda (Mollusca: Prosobranchia), with some remarks on their cytotaxonomy and phylogeny. | Publications of the Seto Marine Biological Laboratory, 31(3/6), 191–267. | phylogeny, prosobranchia, mollusca, archaeogastropoda, remarks, chromosomes, Chromosomes of archaeogastropoda (Mollusca: Prosobranchia), with some remarks on their cytotaxonomy and phylogeny, cytotaxonomy |
| 2047 | Nakamura H., T. Jin, M. Funahashi, and A. Murai. | 1996 | 毒 | Biogenesis and distribution of sulfonium compounds in dinoflagellates: Methionine cascade. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 515–517. | メチオニン/渦鞭毛藻/合成 |
| 2048 | Nakamura Y., H. Ogawa, K. Ouchi, and N. Fujita. | 1989 | クラミドモナス | Nitrogen preferences and morphological variation of <i>Chlamydomonas</i> sp. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 241–244. | <i>Chlamydomonas</i> sp./形態学 |
| 2049 | Nakamura A., T. Okamoto, N. Komatsu, S. Ooka, T. Oda, A. Ishimatsu, and T. Muramatsu. | 1998 | シャツネラ | Fish mucus stimulates the generation of superoxide anion by <i>Chattonella marina</i> and <i>Heterosigma akashiwo</i> . | Fisheries Science, 64(6), 866–869. | red tide plankton/Raphidophyceae/fish mucus/reactive oxygen species |
| 2050 | Nakamura Y., S. Suzuki, and J. Hiromi. | 1995 | ミキモトイ | Population dynamics of heterotrophic dinoflagellates during a <i>Gymnodinium mikimotoi</i> red tide in the Seto Inland Sea. | Mar. Ecol. Prog. Ser., 125, 269–277. | heterotrophic dinoflagellates/microzooplankton/red tide/grazing/growth |
| 2051 | Nakamura Y., J. Takashima, and M. Watanabe. | 1988 | シャツネラ | Chemical environment for red tides due to <i>Chattonella antiqua</i> in the Seto Inland Sea, Japan Part 1. Growth bioassay of the seawater and dependence of growth rate on nutrient concentrations. | J. oceanogr. Soc. Japan, 44, 113–124. | seawater, tides, dependence, rate, chattonella, due, inland, sea, part, japan, bioassay, Chemical environment for red tides due to Chattonella antiqua in the Seto Inland Sea, Japan Part, red, seto, concentrations, chemical, Growth bioassay of the seawater and dependence of growth rate on nutrient concentrations, growth, antiqua, nutrient, environment |
| 2052 | Nakamura Y., J. Takashima, and M. Watanabe. | 1989 | シャツネラ | Chemical environments for red tides of <i>Chattonella antiqua</i> . | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 249–252. | <i>Chattonella antiqua</i> /赤潮/化学因子 |
| 2053 | Nakamura Y., A. Taniguchi, S. Okada, and M. Tokuda. | 1998 | 環境 | Positive growth of phytoplankton under conditions enriched with steel-making slag solution. | ISIJ International, 38(4), 390–398. | growth/enhancement/ <i>in vivo</i> fluorescence/phytoplankton/steel-making slag/waste products |
| 2054 | Nakamura Y. and T. Umemori. | 1991 | シャツネラ | Encystment of the red tide flagellate <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae): Cyst yield in batch cultures and cyst flux in the field. | Mar. Ecol. Prog. Ser., 78, 273–284. | chattonella, tide, encystment of the red tide flagellate <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae), cyst yield in batch cultures and cyst flux in the field, yield, red, cultures, field, encystment, flux, cyst, antiqua, raphidophyceae, batch, flagellate |
| 2055 | Nakamura Y., T. Umemori, and M. Watanabe. | 1989 | シャツネラ | Chemical environment for red tides due to <i>Chattonella antiqua</i> Part 2. Daily monitoring of the marine environment throughout the outbreak period. | J. Oceanogr. Soc. Japan, 45, 116–128. | tides, chattonella, due, period, Daily monitoring of the marine environment throughout the outbreak period, monitoring, outbreak, marine, part, throughout, daily, red, chemical, Chemical environment for red tides due to <i>Chattonella antiqua</i> Part, antiqua, environment |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2056 | Nakamura Y., T. Umemori, M. Watanabe, D. M. Kulis, and D. M. Anderson. | 1990 | シャットネラ | Encystment of <i>Chattonella antiqua</i> in laboratory cultures. | J. Oceanogr. Soc. Japan, 46, 35–43. | chattonella, Encystment of Chattonella antiqua in laboratory cultures, cultures, laboratory, encystment, antiqua |
| 2057 | Nakamura Y. and M. M. Watanabe. | 1983 | シャットネラ | Growth characteristics of <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae) Part 1. Effects of temperature, salinity, light intensity and pH on growth. | J. Oceanogr. Soc. Japan, 39, 110–114. | chattonella, temperature, light, Growth characteristics of Chattonella antiqua (Raphidophyceae) Part, characteristics, part, intensity, Effects of temperature, salinity, light intensity and pH on growth, growth, antiqua, effects, salinity, raphidophyceae |
| 2058 | Nakamura Y. and M. M. Watanabe. | 1983 | シャットネラ | Growth characteristics of <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae) Part 2. Effects of nutrients on growth. | J. Oceanogr. Soc. Japan, 39, 151–155. | chattonella, Growth characteristics of Chattonella antiqua (Raphidophyceae) Part, characteristics, part, Effects of nutrients on growth, growth, antiqua, effects, raphidophyceae, nutrients |
| 2059 | Nakamura Y. and M. M. Watanabe. | 1983 | シャットネラ | Nitrate and phosphate uptake kinetics of <i>Chattonella antiqua</i> grown in light/dark cycles. | J. Oceanogr. Soc. Japan, 39, 167–170. | kinetics, chattonella, light, nitrate, phosphate, uptake, cycles, Nitrate and phosphate uptake kinetics of Chattonella antiqua grown in light/dark cycles, grown, dark, antiqua |
| 2060 | Nakamura Y., Y. Yamazaki, and J. Hiromi. | 1992 | シャットネラ | Growth and grazing of a heterotrophic dinoflagellate, <i>Gyrodinium dominans</i> , feeding on a red tide flagellate, <i>Chattonella antiqua</i> . | Mar. Ecol. Prog. Ser., 82, 275–279. | |
| 2061 | Nakane H., N. Sugimoto, Y. Sasano, and I. Matsui. | 1994 | 環境 | Ozone lidar monitoring. | Global Environmental Research, 1p. | monitoring, ozone, Ozone lidar monitoring, lidar |
| 2062 | 中西雅幸. | 1981 | アコヤガイ | アコヤガイの成長におよぼす水温、塩分、溶存酸素濃度の影響について。 | 京都府立海洋センター研究報告, 5, 23–28. | 溶存酸素濃度、影響、アコヤガイ、水温、塩分、成長 |
| 2063 | 中西克之・増田 健・畠 直亜・山形陽一. | 2001 | 環境 | 英虞湾における底質汚染の現状と近年の進行状況. | 三重県科学技術振興センター水産研究部研究報告, 10, 71–77. | 底質汚染、英虞湾、進行状況、現状 |
| 2064 | 中野拓治・山田耕士・金子俊幸・中嶋雅孝・本城凡夫. | 2006 | シャットネラ | 有明海における <i>Ceratium furca</i> と <i>Chattonella</i> 属の日周鉛直運動の特徴および躍層との関係. | 水環境学会誌, 29(8), 489–494. | diurnal vertical migration/red tide/ <i>Ceratium</i> / <i>Chattonella</i> / Ariake Sea |
| 2065 | Nakano T., Y. Yamada, T. Matsuo, and S. Yamada. | 1998 | 環境 | In-situ second-harmonic generation and luminescence measurements for structural characterization of ruthenium-polypyridine complex monolayers with two and four aliphatic tails at the air/water interface. | Journal of Physical Chemistry B, 102(43), 8569–8573. | two, monolayers, aliphatic, situ, second, tails, measurements, In-situ second-harmonic generation and luminescence measurements for structural characterization of ruthenium-polypyridine complex monolayers with two and four aliphatic tails at the air/water interface, characterization, ruthenium, harmonic, generation, interface, polypyridine, four, complex, structural, water, air, luminescence |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2066 | 中田尚宏. | 1981 | 赤潮一般 | 東京湾(神奈川県海面)における赤潮発生状況(1976年～1980年). | 神奈川県の水生生物, 3, 127–129. | 赤潮発生状況, 海面, 東京湾, 神奈川 |
| 2067 | 中田憲一・飯塚昭二. | 1987 | 生活環・ミキモトイ | 赤潮渦鞭毛藻 <i>Gymnodinium nagasakiense</i> の越冬に関する一観察(短報). | 日本プランクトン学会報, 34(2), 199–201. | 赤潮渦鞭毛藻 <i>Gymnodinium nagasakiense</i> , 越冬, 観察(短報), <i>gymnodinium</i> , <i>nagasakiense</i> |
| 2068 | 中山 仁. | 1995 | 毒 | フグはなぜ自分のフグ毒に中毒しないのか. | 化学と生物, 33(9), 585–590. | フグ毒, フグ, 自分 |
| 2069 | Nakayama K., H. Iwata, E. Y. Kim, K. Tashiro, and S. Tanabe. | 2006 | 環境 | Gene expression profiling in common cormorant liver with an oligo array: Assessing the potential toxic effects of environmental contaminants. | Environmental Science & Technology, 40(3), 1076–1083. | potential, gene, liver, oligo, gene expression profiling in common cormorant liver with an oligo array, assessing the potential toxic effects of environmental contaminants, array, common, cormorant, assessing, expression, environmental, contaminants, toxic, profiling, effects |
| 2070 | Nakayama K., Y. Oshima, K. Hiramatsu, and T. Honjo. | 2004 | スズ | Alteration of general behavior of male medaka, <i>Oryzias latipes</i> , exposed to tributyltin and/or polychlorinated biphenyls. | J. Fac. Agr., Kyushu Univ., 49(1), 85–92. | Alteration of general behavior of male medaka, <i>Oryzias latipes</i> , exposed to tributyltin and/or polychlorinated biphenyls, oryzias, medaka, male, biphenyls, tributyltin, exposed, latipes, polychlorinated, general, alteration, behavior |
| 2071 | Nakayama K., Y. Oshima, K. Hiramatsu, Y. Shimasaki, and T. Honjo. | 2005 | スズ | Effects of polychlorinated biphenyls on the schooling behavior of Japanese medaka (<i>Oryzias latipes</i>). | Environmental Toxicology and Chemistry, 24(10), 2588–2593. | Schooling/Polychlorinated biphenyls/Japanese medaka/Fractal dimension |
| 2072 | Nakayama K., Y. Oshima, K. Nagafuchi, T. Hano, Y. Shimasaki, and T. Honjo. | 2005 | スズ | Early-life-stage toxicity in offspring from exposed parent medaka, <i>Oryzias latipes</i> , to mixtures of tributyltin and polychlorinated biphenyls. | Environmental Toxicology and Chemistry, 24(3), 591–596. | Tributyltin/Polychlorinated biphenyls/Medaka/Maternal exposure/Mixture toxicity |
| 2073 | Nakayama K., Y. Oshima, T. Tachibana, M. Furuse, and T. Honjo. | 2007 | スズ | Alteration of monoamine concentrations in the brain of medaka, <i>Oryzias latipes</i> , exposed to tributyltin. | Environmental Toxicology, 22, 53–57. | brain/Japanese medaka/monoamines/tributyltin |
| 2074 | Nakayama K., Y. Oshima, T. Yamaguchi, Y. Tsuruda, I. J. Kang, M. Kobayashi, N. Imada, and T. Honjo. | 2004 | スズ | Fertilization success and sexual behavior in male medaka, <i>Oryzias latipes</i> , exposed to tributyltin. | Chemosphere, 55, 1331–1337. | Tributyltin/Polychlorinated biphenyls/Medaka/Reproduction/Sexual behavior |
| 2075 | Nakayama K., N. Sei, Y. Oshima, K. Tashiro, Y. Shimasaki, and T. Honjo. | 2008 | スズ | Alteration of gene expression profiles in the brain of Japanese medaka (<i>Oryzias latipes</i>) exposed to KC-400 or PCB126. | Marine Pollution Bulletin, 57(6–12), 460–466. | Japanese medaka/Microarray/Brain/PCB126/KC-400 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2076 | Nandakumar K., H. Obika, K. Sreekumari, A. Utsumi, T. Ooie, and T. Yano. | 2009 | 環境 | Laser damage to marine plankton and its application to checking biofouling and invasion by aquatic species: A laboratory study. | Biofouling, 25(2), 95–98. | laser irradiation/phytoplankton/antifouling/bioinvasion/flow-through system |
| 2077 | Narashashi T. | 1975 | 毒 | Mode of action of dinoflagellate toxins on nerve membranes. | The First International Conference on Toxic Dinoflagellate Blooms, 395–402. | 神経膜/渦鞭毛藻/毒/作用 |
| 2078 | Negri A. P., C. J. S. Bolch, S. I. Blackburn, M. Dickman, L. E. Llewellyn, and S. Méndez. | 2001 | カテナータム | Paralytic shellfish toxins in <i>Gymnodinium catenatum</i> strains from six countries. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 210–213. | <i>Gymnodinium catenatum</i> /PSP |
| 2079 | Negri R. M. and D. Inza. | 1998 | 珪藻 | Some potentially toxic species of <i>Pseudo-nitzschia</i> in the Argentine Sea (35°–39° S). | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 84–85. | <i>Pseudo-nitzschia</i> /有毒/アルゼンチン |
| 2080 | Negri A. P., G. J. Jones, and S. Blackburn. | 1998 | 淡水赤潮 | Paralytic shellfish toxins in Australian strains of the freshwater cyanobacterium <i>Anabaena circinalis</i> . | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 345–348. | PSP/オーストラリア/淡水/藍藻/ <i>Anabaena circinalis</i> |
| 2081 | 根本敬久・藤田善彦・高橋正征・堀越増興・沖山宗雄・多賀信夫・前田昌調・岡市友利. | 1981 | 環境 | 日本における海洋学最近10年の歩み－生物海洋学. | 日本海洋学会誌, 37(6), 329–342. | 日本, 歩み, 生物海洋学, 海洋学 |
| 2082 | Nemoto Y. and M. Furuya. | 1985 | シャットネラ | Inductive and inhibitory effects of light on cell division in <i>Chattonella antiqua</i> . | Plant Cell Physiol., 26(4), 669–674. | cell division/ <i>Chattonella antiqua</i> /light effect/Raphidophyceae/synchronous culture |
| 2083 | Nemoto Y., T. Kuroiwa, and M. Furuya. | 1987 | シャットネラ | Photocontrol of nuclear DNA replication in <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae). | Plant and Cell Physiol., 28(6), 1043–1049. | Cell cycle/ <i>Chattonella antiqua</i> /DNA replication/Light effect/Raphidophyceae/Synchronous culture |
| 2084 | Nézan E., N. Chomérat, G. Bilien, S. Boulben, A. Duval, and M. Ryckaert. | 2010 | 珪藻 | <i>Pseudo-nitzschia australis</i> on French Atlantic coast—an unusual toxic bloom. | Harmful Algae News, 41, 1–2. | |
| 2085 | Nezan E., N. Chomerat, M. P. Crassous, and E. Antoine. | 2007 | 珪藻 | Identification of <i>Pseudo-nitzschia multistriata</i> and <i>P. subpacifica</i> from French waters. Were they part of the cryptic flora? | Harmful Algae News, 35, 5–6. | waters, nitzschia, cryptic, flora, french, part, multistriata, identification, subpacifica, Identification of <i>Pseudo-nitzschia multistriata</i> and <i>P. subpacifica</i> from French waters Were they part of the cryptic flora, pseudo |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2086 | NFRDI (National Fisheries Research and Development Institute). | 2000 | 赤潮一般 | Proceedings of the inter-state symposium on harmful algal blooms and clays—the evaluation on the mitigation capability of clay and yellow loess at the harmful alga blooms and their impacts on marine ecosystem. | Pusan, Korea, 121p. | yellow, impacts, algal, Proceedings of the inter-state symposium on harmful algal blooms and clays – the evaluation on the mitigation capability of clay and yellow loess at the harmful alga blooms and their impacts on marine ecosystem, symposium, clay, marine, alga, harmful, loess, state, inter, evaluation, capability, ecosystem, blooms, proceedings, mitigation, clays |
| 2087 | Nguyen N. L. and N. H. Doan. | 1996 | 赤潮一般 | Harmful marine phytoplankton in Vietnam waters. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 45–48. | ベトナム/有害藻類 |
| 2088 | Nichols D. B., M. F. Satchwell, J. E. Alexander, N. M. Martin, M. T. Baesl, and G. L. Boyer. | 2001 | ブラウンタイプ | Iron nutrition in the brown tide alga, <i>Aureococcus anophagefferens</i> : Characterization of a ferric chelate reductase activity. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 340–343. | 鉄/brown tide/ <i>Aureococcus anophagefferens</i> /栄養 |
| 2089 | Nielsen E. S. | 1952 | 環境 | The use of radio-active carbon (C^{14}) for measuring organic production in the sea. | Journal du Conseil, 18, 117–140. | for measuring organic production in the sea, c14, measuring, production, sea, radio, organic, carbon, active, use, the use of radio-active carbon, C |
| 2090 | Nielsen E. S. | 1954 | 環境 | On organic production in the oceans. | Journal du Conseil, 19, 309–328. | On organic production in the oceans, production, oceans, organic |
| 2091 | Nielsen E. S. | 1965 | 環境 | On the determination of the activity in ^{14}C -ampoules for measuring primary production. | Limnology and Oceanography, 10, R247–R252. | ampoules, determination, measuring, production, activity, On the determination of the activity in, 14c, primary, C-ampoules for measuring primary production |
| 2092 | Nielsen M. V. | 1992 | ギロディニウム | Irradiance and daylength effects on growth and chemical composition of <i>Gyrodinium aureolum</i> Hulbert in culture. | J. Plankton Res., 14(6), 811–820. | composition, irradiance, gyrodinium, culture, chemical, daylength, aureolum, growth, Irradiance and daylength effects on growth and chemical composition of Gyrodinium aureolum Hulbert in culture, effects, hulbert |
| 2093 | Nielsen G., H. Kaas, and H. Ravn. | 1993 | オーレオラム | Vertical migration of <i>Gyrodinium aureolum</i> in an artificial water column. | Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, T. J. Smayda and Y. Shimizu, editors, 789–794. | <i>Gyrodinium aureolum</i> /鉛直移動/カラム |
| 2094 | Nielsen M. V. and T. Strømgen. | 1991 | 赤潮一般 | Shell growth response of mussels (<i>Mytilus edulis</i>) exposed to toxic microalgae. | Marine Biology, 108(2), 263–267. | microalgae, mussels, exposed, mytilus, edulis, toxic, growth, shell, Shell growth response of mussels (<i>Mytilus edulis</i>) exposed to toxic microalgae, response |
| 2095 | 日本海洋学会. | 2005 | 環境 | 有明海の生態系再生をめざして. | 恒星社厚生閣, 東京, 15p. | 有明海, 生態系再生 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2096 | 日本水産学会. | 1977 | 環境 | 浅海養殖と自家汚染. | 水産学シリーズ21, 恒星社厚生閣, 東京, 134p. | 自家汚染, 浅海養殖 |
| 2097 | 日本薬学会. | 2005 | 環境 | 衛生試験法注解2005. | 日本薬学会編, 172p. | 衛生試験法注解 |
| 2098 | 新留康郎・土屋 元・山中俊介・松尾 拓・山田 淳. | 1998 | その他 | アゾ系色素をドープした高分子超薄膜積層体の電気光学効果: 電場配向処理に対する異方性. | 平成8~9年度文部省科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書, 38-44. (九州大学中央分析センター報告, 印刷中). | 電気光学効果, 電場配向処理, 薄膜積層体, 高分子, アゾ系色素, 性 |
| 2099 | Nikaido H. and M. Vaara. | 1985 | アレロバシー | Molecular basis of bacterial outer membrane permeability. | Microbiological Reviews, 49(1), 1-32. | molecular, bacterial, membrane, outer, permeability, Molecular basis of bacterial outer membrane permeability, basis |
| 2100 | Nirmala K., Y. Oshima, R. Lee, N. Imada, T. Honjo, and K. Kobayashi. | 1999 | スズ | Transgenerational toxicity of tributyltin and its combined effects with polychlorinated biphenyls on reproductive processes in Japanese medaka (<i>Oryzias latipes</i>). | Environmental Toxicology and Chemistry, 18(4), 717-721. | Tributyltin/Polychlorinated biphenyls/Combined effects/Medaka/ <i>Oryzias latipes</i> /Reproduction |
| 2101 | Nishibori N., Y. Matuyama, T. Uchida, T. Moriyama, Y. Ogita, M. Oda, and H. Hirota. | 2003 | 環境 | Spatial and temporal variations in free polyamine distributions in Uranouchi Inlet, Japan. | Marine Chemistry, 82, 307-314. | Coastal seawater/Water chemistry/Polyamine/HPLC/Cation exchange resin/Uranouchi Inlet |
| 2102 | Nishibori N., M. Niitsu, S. Fujihara, T. Segara, S. Nishio, and I. Imai. | 2009 | シャットネラ | Occurrence of the polyamines caldopentamine and homocaldopentamine in axenic cultures of the red tide flagellates <i>Chattonella antiqua</i> and <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae). | FEMS Microbiol. Lett., 298, 74-78. | caldopentamine/homocaldopentamine/ <i>Chattonella antiqua</i> / <i>Heterosigma akashiwo</i> |
| 2103 | Nishibori N. and T. Nishijima. | 2004 | シャットネラ | Changes in polyamine levels during growth of a red-tide causing phytoplankton <i>Chattonella antiqua</i> (Raphidophyceae). | Eur. J. Phycol., 39(1), 51-55. | <i>Chattonella antiqua</i> /growth/MGBG/polyamine/spermidine |
| 2104 | 西堀尚良・西島敏隆・畠 幸彦. | 2000 | 淡水赤潮 | 淡水赤潮プランクトン <i>Peridinium bipes</i> f. <i>occultatum</i> (LINDEM.) LEF. の増殖に及ぼすリン酸塩、カルシウムおよびB群ビタミン類の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 66(5), 812-817. | 淡水赤潮/ <i>Peridinium bipes</i> f. <i>occultatum</i> /リン要求量/B群ビタミン/カルシウム |
| 2105 | 西堀尚良・西島敏隆・小野田義輝・畠 幸彦. | 1991 | 淡水赤潮 | 淡水赤潮プランクトン <i>Peridinium bipes</i> fo. <i>Occultatum</i> の増殖に及ぼす照度、温度、pH および窒素栄養塩の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 57(9), 1729-1735. | 照度, bipes, 影響, 増殖, peridinium, 温度, occultatum, 淡水赤潮プランクトン <i>Peridinium bipes</i> fo <i>occultatum</i> , pH, 窒素栄養塩 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2106 | Nishibori N., A. Yuasa, M. Sakai, S. Fujihara, and S. Nishio. | 2001 | 環境 | Free polyamine concentrations in coastal seawater during phytoplankton bloom. | Fisheries Science, 67(1), 79–83. | bloom/phytoplankton/polyamine/putrescine/seawater/sp ermidine |
| 2107 | 西原 力. | 1982 | 生活環 | <i>Bacillus megatrium</i> の芽胞殻の化学構造と発芽機構との関連 | 日本細菌学雑誌, 37(5), 829–838. | bacillus, <i>Bacillus megatrium</i> , megatrium, 発芽機構, 芽胞殻, 関連, 化学構造 |
| 2108 | 西原 力. | 1989 | 環境 | 微生物のリスクアセスメント. | 機関誌Makoto, 66, 1–8. | リスクアセスメント, 微生物 |
| 2109 | Nishihara T., H. Maeda, K. Okamoto, T. Oshida, T. Mizoguchi, and T. Terada. | 1991 | アレロバシー | Inactivation of human placenta glutathione s-transferase by SH/SS exchange reaction with biological disulfides. | Biochemical and Biophysical Research Communications, 174(2), 580–585. | reaction, Inactivation of human placenta glutathione s-transferase by SH/SS exchange reaction with biological disulfides, placenta, inactivation, disulfides, exchange, human, biological, transferase, glutathione |
| 2110 | Nishihara T., Y. Takubo, E. Kawamata, T. Koshikawa, J. Ogaki, and M. Kondo. | 1989 | アレロバシー | Role of outer coat in resistance of <i>Bacillus megaterium</i> spore. | J. Biochem., 106, 270–273. | bacillus, spore, role, outer, coat, Role of outer coat in resistance of <i>Bacillus megaterium</i> spore, resistance, megaterium |
| 2111 | 西島敏隆. | 1985 | 赤潮一般・環境 | 沿岸海域におけるB群ビタミンの動態に関する研究. | 高知大学農学部紀要, 43, 1–154. | B群ビタミン, 沿岸海域, 研究, 動態 |
| 2112 | 西島敏隆. | 1994 | 環境 | 海洋微生物の生産する汚損生物付着忌避物質に関する研究. | 平成4年度科学研究費補助金(一般研究C) 研究成果報告書, 1–20. | 海洋微生物, 研究, 汚損生物付着忌避物質 |
| 2113 | 西島敏隆・畠 幸彦. | 1984 | ヘテロシグマ | <i>Heterosigma akashiwo</i> Hada のB群ビタミン要求に関する増殖生理. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(9), 1505–1510. | <i>Heterosigma akashiwo</i> Hada, heterosigma, hada, B群ビタミン要求, 増殖生理, akashiwo |
| 2114 | 西島敏隆・畠 幸彦. | 1986 | 珪藻 | <i>Skeletonema costatum</i> (Greville) Cleve 及び <i>Eutreptiella</i> sp. のB群ビタミン要求に関する増殖生理. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 52(2), 173–179. | <i>skeletonema</i> , cleve, eutreptiella, costatum, <i>Skeletonema costatum</i> (Greville) Cleve, B群ビタミン要求, <i>Eutreptiella</i> sp., 増殖生理, greville |
| 2115 | Nishijima T. and Y. Hata. | 1986 | シャットネラ | Physiological ecology of <i>Chattonella antiqua</i> (Hada) Ono on B group vitamin requirements. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 52(2), 181–186. | chattonella, group, Physiological ecology of <i>Chattonella antiqua</i> (Hada) Ono on B group vitamin requirements, hada, ecology, ono, vitamin, physiological, antiqua, requirements |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2116 | Nishijima T. and Y. Hata. | 1989 | シャットネラ | The dynamics of vitamin B12 and its relation to the outbreak of <i>Chattonella</i> red tides in Harima Nada, the Seto Inland Sea. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 257–260. | ビタミンB12/瀬戸内海/ <i>Chattonella</i> /赤潮 |
| 2117 | 西島敏隆・畠 幸彦・山内章三. | 1989 | 珪藻 | 赤潮渦鞭毛藻 <i>Prorocentrum triestinum</i> の増殖生理. | Nippon Suisan Gakkaishi, 55(11), 2009–2014. | 赤潮渦鞭毛藻 <i>Prorocentrum triestinum</i> , <i>triestinum</i> , <i>prorocentrum</i> , 増殖生理 |
| 2118 | 西川藤吉. | 1900 | 赤潮一般 | 赤潮に就いて. | 動物学雑誌, 12, 127–133. | 赤潮 |
| 2119 | 西川藤吉. | 1903 | 赤潮一般 | 再び赤潮に就いて. | 動物学雑誌, 15, 347–353. | 赤潮 |
| 2120 | 西川哲也. | 2002 | 珪藻 | ノリの色落ち原因藻 <i>Eucampia zodiacus</i> の増殖に及ぼす水温、塩分および光強度の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 68(3), 356–361. | <i>Eucampia zodiacus</i> /珪藻/環境要因/増殖速度/ノリの色落ち |
| 2121 | 西川哲也 | 2010 | 珪藻 | 養殖ノリ色落ち原因珪藻 <i>Eucampia zodiacus</i> の大量発生機構に関する生理生態学的. | 博士論文. | 養殖ノリ色落ち原因珪藻 <i>Eucampia zodiacus</i> , <i>eucampia</i> , <i>zodiacus</i> , 大量発生機構 |
| 2122 | 西川哲也・堀 豊. | 2004 | 珪藻 | ノリの色落ち原因藻 <i>Eucampia zodiacus</i> の増殖に及ぼす窒素、リンおよび珪素の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 70(1), 31–38. | <i>Eucampia zodiacus</i> /窒素/リン/珪素/比増殖速度/最小細胞内含量/ノリの色落ち |
| 2123 | 西川哲也・堀 豊. | 2004 | 珪藻 | ノリの色落ち原因藻 <i>Coscinodiscus wailesii</i> の増殖に及ぼす窒素、リンおよび珪素の影響. | 日水誌, 70(6), 872–878. | <i>Coscinodiscus wailesii</i> /栄養塩/増殖速度/最小細胞内含量/ノリの色落ち |
| 2124 | 西川哲也・堀 豊・長井 敏・宮原一隆・吉田陽一・小玉一哉・酒井康彦. | 2000 | 珪藻 | 播磨灘における <i>Coscinodiscus wailesii</i> の発生と水質、気象要因等との関係. | Nippon Suisan Gakkaishi, 66(3), 388–394. | 播磨灘/ <i>Coscinodiscus wailesii</i> /水質要因/気象要因/季節の変化 |
| 2125 | Nishikawa T., Y. Hori, S. Nagai, K. Miyahara, Y. Nakamura, K. Harada, M. Tanda, T. Manabe, and K. Tada. | 2010 | 環境 | Nutrient and phytoplankton dynamics in Harima-Nada, eastern Seto-Inland Sea, Japan during a 35-year period from 1973 to 2007. | Estuaries and Coasts, 33, 417–427. | <i>Chaetoceros</i> /Diatoms/Nutrients/Phytoplankton dynamics/Seto Inland Sea / <i>Skeletonema</i> |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2126 | 西川哲也・宮原一隆・長井 敏・榎本陽子. | 1999 | 環境 | 1993年1月～1997年12月の南二見における定置観測結果の整理. | 兵庫県立水産試験場研究報告, 35, 23–32. | 定置観測/気温/水温/塩分/降水量 |
| 2127 | 西川哲也・宮原一隆・長井 敏. | 2000 | 珪藻 | 播磨灘産大型珪藻 <i>Coscinodiscus wailesii</i> の増殖に及ぼす水温、塩分の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 66(6), 993–998. | <i>Coscinodiscus wailesii</i> /播磨灘/珪藻/水温/塩分/増殖速度 |
| 2128 | 西川哲也・宮原一隆・長井 敏. | 2002 | 珪藻 | 播磨灘産有害珪藻 <i>Coscinodiscus wailesii</i> Gran の光強度に対する増殖応答. | 日本プランクトン学会報, 49(1), 1–8. | <i>Coscinodiscus wailesii</i> /diatom/growth rate/irradiance/Harima-nada |
| 2129 | 西村昭史. | 1982 | ミキモトイ・シャットネラ | 魚類養殖場の有機汚染が赤潮生物 <i>Gymnodinium</i> type-'65 および <i>Chattonella antiqua</i> の増殖に及ぼす影響. | Bull. Plankton Soc. Japan, 29(1), 1–7. | |
| 2130 | Nishimura M., K. Kita-Tsukamoto, K. Kogure, and K. Ohwada. | 1992 | DNA | Enumerations of <i>Vibrio cholerae</i> in aquatic environments by MPN-16S rRNA hybridization method. | Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology, 7(1), 43–46. | 16S rRNA/ <i>Vibrio cholerae</i> /MPN |
| 2131 | Nishimura M., K. Kita-Tsukamoto, K. Kogure, K. Ohwada, and U. Simidu. | 1993 | DNA | A new method to detect viable bacteria in natural seawater using 16SrRNA oligonucleotide probe. | Journal of Oceanography, 49, 51–56. | seawater, probe, viable, method, a new method to detect viable bacteria in natural seawater using, using, detect, natural, new, 16srna, oligonucleotide, bacteria, 16SrRNA oligonucleotide probe |
| 2132 | 西村昭史・閔 政夫. | 1983 | 環境 | 養殖漁場改良における石灰の作用. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 49(3), 353–358. | 石灰, 養殖漁場改良, 作用 |
| 2133 | 西尾幸郎. | 1982 | 毒 | 4. 有毒・有害プランクトンの魚介類への影響. 有毒プランクトン発生・作用機構・毒成分. | 水産学シリーズ, 日本水産学会監修, 恒星社厚生閣, 50–61. | 影響有毒プランクトン, 発生, 有毒プランクトン, 毒成分, 有毒, 作用機構, 魚介類 |
| 2134 | 西岡 純. | 2006 | 環境 | 北太平洋における鉄の存在状態と鉄が生物生産におよぼす影響に関する研究. | 海の研究, 15(1), 19–36. | 鉄/存在状態/植物プランクトン/鉄散布実験/北太平洋亜寒帯域 |
| 2135 | 西岡 純・和田洋藏・今西裕一. | 1993 | カテナータム | 久美浜湾における <i>Gymnodinium catenatum</i> (Dinophyceae) の出現について. | 京都府立海洋センター研究報告, 16, 43–49. | <i>Gymnodinium catenatum</i> (Dinophyceae), 出現, <i>gymnodinium</i> , <i>dinophyceae</i> , 久美浜湾, <i>catenatum</i> |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2136 | Nishitani L., G. Erickson, and K. K. Chew. | 1985 | アレキサンドリウム | Role of the parasitic dinoflagellate <i>Amoebophrya ceratii</i> in control of <i>Gonyaulax catenella</i> populations. | Elsevier Science Publishing Co., Inc. Toxic Dinoflagellates, Anderson, White, and Baden, Editors, 225–230. | <i>Amoebophrya ceratii</i> / <i>Gonyaulax catenella</i> / 麻性毒 / 潟鞭毛藻 |
| 2137 | 西沢 敏. | 1966 | 環境 | 海中懸濁物 デトライタスから共棲小宇宙まで | 日本プランクトン研究連絡会報. 13, 1–33. | デトライタス, 共棲小宇宙 |
| 2138 | Nixon S. W. | 1989 | ポリレピス | An extraordinary red tide and fish kill in Narragansett Bay. | Novel Phytoplankton Blooms, 429–447. | ナラガンセット湾/魚/斃死/赤潮 |
| 2139 | Njus D. and E. Swift. | 1979 | 赤潮一般 | Bioluminescence. | Toxic Dinoflagellate Blooms, 459–462. | 生物冷光 |
| 2140 | Noe-Nygaard N., F. Surlyk, and S. Piasecki. | 1987 | ヘテロカプサ・赤潮一般 | Bivalve mass mortality caused by toxic dinoflagellate blooms in a Berriaskan–Valanginian lagoon, Bornholm, Denmark. | Palaios, 2, 263–273. | bivalve, caused, mortality, berriasan, Bivalve mass mortality caused by toxic dinoflagellate blooms in a Berriaskan–Valanginian lagoon, Bornholm, Denmark, dinoflagellate, bornholm, mass, valanginian, lagoon, blooms, toxic, denmark |
| 2141 | 野口玉雄. | 1994 | 毒 | 貝毒対策の現状および問題点. | Nippon Suisan Gakkaishi, 60(5), 677–678. | 問題点, 貝毒対策, 現状 |
| 2142 | 野口玉雄・赤枝 宏. | 1996 | 毒 | 生物にとって保有する毒とは何か. | 海洋と生物 105, 18(4), 268–272. | 毒, 生物 |
| 2143 | 野口玉雄・赤枝 宏. | 1996 | 毒 | 海産生物毒の食物連鎖による毒化機構. | 海洋と生物 105, 18(4), 289–292. | 食物連鎖, 海産生物毒, 毒化機構 |
| 2144 | Noguchi T., M. Asakawa, O. Arakawa, Y. Fukuyo, S. Nishio, K. Tanno, and K. Hashimoto. | 1990 | アレキサンドリウム | First occurrence of <i>Alexandrium catenella</i> in Funka Bay, Hokkaido, along with its unique toxin composition. | Toxic Marine Phytoplankton, 493–498. | <i>Alexandrium catenella</i> / 噴火湾 / 最初の出現 |
| 2145 | Noguchi T., K. Daigo, O. Arakawa, and K. Hashimoto. | 1985 | 毒 | Release of paralytic shellfish poison from the exoskeleton of a xanthid crab <i>Zosimus aeneus</i> . | Elsevier Science Publishing Co., Inc. Toxic Dinoflagellates, Anderson, White, and Baden, Editors, 293–298. | PSP/カニ/甲羅 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2146 | 野口玉雄・宮澤啓輔・松居 隆. | 1994 | 毒 | 貝毒対策の問題点. | Nippon Suisan Gakkaishi, 60(5), 675. | 問題点, 貝毒対策 |
| 2147 | 野口玉雄・長島裕二・丸山純一・上村俊一・橋本周久. | 1984 | 毒 | 麻ひ性貝毒によって著しく毒化したホタテガイにおける貝柱の毒性. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(3), 517-520. | 麻ひ性貝毒, ホタテガイ, 貝柱, 毒性 |
| 2148 | 野口弘三・岡山英史. | 1998 | 環境 | 浮遊期マダイ仔稚魚の食性と餌料生物環境. | 日本プランクトン学会誌, 45(1), 23-27. | マダイ/仔稚魚/食性/餌料環境 |
| 2149 | 野元俊一・丸川久俊. | 1911 | 赤潮一般 | 英虞湾に現れたる赤潮に就きて. | 水産研究誌, 4(6), 139-151. | 英虞湾, 赤潮 |
| 2150 | 野村真郷. | 1994 | 毒 | 貝毒対策の行政対応と問題点. | Nippon Suisan Gakkaishi, 60(5), 679-680. | 問題点, 貝毒対策, 行政対応 |
| 2151 | Norén F., Ø. Moestrup, A. S. Rehnstam-Holm, and J. Larsen. | 2001 | 毒 | Worldwide occurrence and host specificity of <i>Parvilucifera infectans</i> : A parasitic flagellate capable of killing toxic dinoflagellates. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 481-483. | <i>Parvilucifera infectans</i> /共生/渦鞭毛藻/毒 |
| 2152 | 野呂忠秀・水野 純・野沢治治. | 1981 | ミキモトイ | 大村湾産赤潮鞭毛藻 <i>Gymnodinium</i> sp. ('65年型) の超微細構造. | 鹿児島大学水産学部紀要, 30, 179-189. | chloroplast/dinoflagellate/ <i>Gymnodinium</i> /pyrenoid/red tide/theca/ultrastructure |
| 2153 | Noro T. and K. Nozawa. | 1981 | シャットネラ | Ultrastructure of a red tide chloromonadophycean alga, <i>Chattonella</i> sp., from Kagoshima Bay, Japan. | Jap. J. Phycol., 29(2), 73-78. | <i>Chattonella</i> /Chloromonadophyceae/chloroplast/flagellum/Kagoshima Bay/lipid body/red tide/rhizoplast/ultrastructure |
| 2154 | Norris D. R., J. W. Bomber, and E. Balech. | 1985 | 赤潮一般 | Benthic dinoflagellates associated with ciguatera from the Florida Keys. I . <i>Ostreopsis heptagona</i> sp. nov. | Elsevier Science Publishing Co., Inc. Toxic Dinoflagellates, Anderson, White, and Baden, Editors, 39-44. | 府生渦鞭毛藻/シガテラ毒/フロリダキー/ <i>Ostreopsis heptagona</i> |
| 2155 | Norris L. and K. K. Chew. | 1975 | アレキサンドリウム | Effect of environmental factors on growth of <i>Gonyaulax catenella</i> . | The First International Conference on Toxic Dinoflagellate Blooms, 143-152. | <i>Gonyaulax catenella</i> /培養/環境要因 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2156 | Norris L., K. K. Chew, and A. C. Duxbury. | 1973 | 赤潮一般 | Shellfish and the red tide. | Pacific search. | Shellfish and the red tide, shellfish, tide, red |
| 2157 | Nozawa K. | 1968 | 赤潮一般・アレロバシー | The effect of <i>Peridinium</i> toxin on other algae. | Bull. Misaki Mar. Inst., Univ. of Tokyo., 12, 21–24. | toxin, The effect of Peridinium toxin on other algae, effect, algae, peridinium |
| 2158 | 野澤治治・野呂忠秀. | 1981 | シャツネラ | 赤潮鞭毛藻 <i>Chattonella</i> sp. の増殖と低温耐性に及ぼす有機炭素化合物の影響. | 内湾海域赤潮生物挙動試験研究報告書, 水産庁, 1–6. | 低温耐性, chattonella, 影響, 有機炭素化合物, 増殖, 赤潮鞭毛藻 <i>Chattonella</i> sp. |
| 2159 | Nozue H., T. Hayashi, Y. Hashimoto, T. Ezaki, K. Hamasaki, K. Ohwada, and Y. Terawaki. | 1992 | 環境 | Isolation and characterization of <i>Shewanella alga</i> from human clinical specimens and emendation of the description of <i>S. alga</i> Simidu et al., 1990, 335. | International Journal of Systematic Bacteriology, 42(4), 628–634. | isolation, description, characterization, clinical, isolation and characterization of <i>Shewanella alga</i> from human clinical specimens and emendation of the description of <i>S. alga</i> Simidu et al., shewanella, alga, emendation, human, simidu, specimens |
| 2160 | 沼口勝之. | 1985 | アコヤガイ | 摂餌量の指標としてのアコヤガイ消化盲嚢に含まれるフェオフィチンの検討. | 養殖研報, 7, 91–96. | pearl oyster/digestive diverticula/acetone extract/phaeophytin/feeding |
| 2161 | 沼口勝之. | 1990 | 環境 | アサリ漁場における底層水、セジメントおよび底泥のクロロフィルaとフェオ色素量. | 養殖研報, 18, 39–50. | chlorophyll a/estuary/fractionated particle/phaeo-pigments/sediment/short necked clam |
| 2162 | Numaguchi K. | 1994 | アコヤガイ | Growth and physiological condition of the Japanese pearl oyster, <i>Pinctada fucata martensi</i> (Dunker, 1850) in Ohmura Bay, Japan. | Journal of Shellfish Research, 13(1), 93–99. | Japanese pearl oyster/growth/mortality/condition index/filtration rate/glycogen/red tide |
| 2163 | 沼口勝之. | 1994 | 環境 | 真珠養殖漁場における懸濁物の粒子組成と植物色素量. | 水産工学, 30(3), 181–184. | pearl farm/fine particle/food environment |
| 2164 | 沼口勝之. | 1994 | アコヤガイ | アコヤガイのろ水率におよぼす水温の影響. | 水産増殖, 42(1), 1–6. | アコヤガイ/ろ水率/水温 |
| 2165 | Numaguchi K. | 1995 | アコヤガイ | Effects of water temperature on catabolic losses of meat and condition index of unfed pearl oyster <i>Pinctada fucata martensi</i> . | Fisheries Science, 61(5), 735–738. | pearl oyster/unfed/condition index/catabolic losses/water temperatures |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2166 | Numaguchi K. | 1995 | アコヤガイ | Influences of unfed condition on the mortality of pearl oyster <i>Pinctada fucata martensi</i> . | Fisheries Science, 61(5), 739–742. | pearl oyster/unfed condition/mortality |
| 2167 | 沼口勝之. | 1995 | アコヤガイ | 穿孔性多毛類のアカガイ貝殻への穿孔状況とその駆除法. | 付着生物研究, 12(1), 1–7. | ボリドラ/アカガイ/駆除法 |
| 2168 | 沼口勝之. | 1996 | アコヤガイ | アカガイ人工種苗の養殖漁場における成熟過程. | Nippon Suisan Gakkaishi, 62(3), 384–392. | アカガイ/人工種苗/成熟/産卵期/性比/抱卵数 |
| 2169 | 沼口勝之. | 1996 | アコヤガイ | アコヤガイの餌料環境と摂餌生態. | 中央水産研究所研究報告, 8, 123–138. | アコヤガイ, 餌生態, 餌料環境 |
| 2170 | 沼口勝之・船越将二. | 1985 | 環境 | 人工アカガイ若年級群の生殖巣発達. | 西海区ブロック浅海開発会議 藻類・介類研究会報, 2, 69–74. | 人工アカガイ若年級群, 生殖巣発達 |
| 2171 | 沼口克之・平山和次. | 1972 | ミキモトイ | 大村湾赤潮原因種 <i>Gymnodinium</i> '65年型種の培養に好適なpHと塩分について. | 長崎大学水産学部研究報告, 33, 7–10. | 培養, <i>gymnodinium</i> , 大村湾赤潮原因種 <i>Gymnodinium</i> '65, pH, 塩分, 型種 |
| 2172 | Numaguchi K. and J. A. Nell. | 1991 | アコヤガイ | Effects of gelatin-acacia microcapsule and algal meal supplementation of algal diets on growth rates of Sydney rock oyster, <i>Saccostrea commercialis</i> (Iredale & Roughley), larvae. | Aquaculture, 94, 65–78. | meal, supplementation, saccostrea, oyster, larvae, algal, acacia, gelatin, sydney, Effects of gelatin-acacia microcapsule and algal meal supplementation of algal diets on growth rates of Sydney rock oyster, <i>Saccostrea commercialis</i> (Iredale & Roughley), larvae, rock, commercialis, rates, diets, microcapsule, iredale, growth, roughley, effects |
| 2173 | 沼口勝之・田中彌太郎. | 1986 | アコヤガイ | アコヤガイ付着初期稚貝のへい死、成長におよぼす水温の影響. | 養殖研報, 9, 35–39. | pearl oyster/ <i>Pinctada</i> /spat/temperature/mortality/growth |
| 2174 | 沼口勝之・田中彌太郎. | 1986 | アコヤガイ | アコヤガイ付着初期稚貝のへい死、成長におよぼす塩分の影響. | 養殖研報, 9, 41–44. | pearl oyster/ <i>Pinctada</i> /spat/salinity |
| 2175 | 沼口勝之・田中彌太郎. | 1987 | アコヤガイ | ハマグリ初期稚貝の成長におよぼす水温および塩分の影響. | 養殖研報, 11, 35–40. | clam/ <i>Meretrix</i> /growth/temperature/salinity |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2176 | Nuzzi R. and R. M. Waters. | 1989 | ブラウンタイド | The spatial and temporal distribution of "brown tide" in eastern Long Island. | Novel Phytoplankton Blooms, 117–137. | brown tide/分布/ロングアイランド |
| 2177 | Nuzzi R. and R. M. Waters. | 1993 | 毒 | The occurrence of PSP toxin in Long Island, New York, USA. | Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, T. J. Smayda and Y. Shimizu, editors, 305–310. | ニューヨーク/PSP/ロングアイランド |
| 2178 | Nyman U. and E. Granéli. | 1983 | 環境 | Alkaline phosphatase activity in the Laholm Bay, south-eastern Kattegat. | Sarsia, 68, 275–279. | south, bay, activity, Alkaline phosphatase activity in the Laholm Bay, south-eastern Kattegat, alkaline, phosphatase, lahholm, kattegat, eastern |
| 2179 | Oba Y., Y. Shimasaki, Y. Oshima, H. Satone, T. Kitano, M. Nakao, S. Kawabata, and T. Honjo. | 2007 | スズ | Purification and characterization of tributyltin-binding protein type 2 from plasma of Japanese flounder, <i>Paralichthys olivaceus</i> . | J. Biochem., 142, 229–238. | detoxification/glycoprotein/Japanese flounder/lipocalin superfamily/serum protein |
| 2180 | O'Boyle S., G. Nolan, and R. Raine. | 2001 | 赤潮一般 | Harmful phytoplankton events caused by variability in the Irish Coastal Current along the west of Ireland. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 145–148. | 有害/アイルランド |
| 2181 | Ochi T. | 1989 | 赤潮一般 | The development of anoxic water and red tide associated with eutrophication in Hiuchi Nada, the Seto Inland Sea, Japan. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 201–204. | 瀬戸内海/赤潮/貧酸素 |
| 2182 | 落合忍仁・W. T. Yasutake・R. W. Gold. | 1985 | 環境 | パラフィン包埋組織切片による細菌性腎臓病菌検出のための蛍光抗体法の応用. | 魚病研究, 19(4), 271–272. | 細菌性腎臓病菌検出, 蛍光抗体法, 応用, 組織切片 |
| 2183 | 尾田方七. | 1935 | ミキモトイ・赤潮一般 | <i>Gymnodinium mikimotoi</i> Miyake et Kominami n. sp. (MS.) の赤潮と硫酸銅の効果. | 動物学雑誌, 47, 35–48. | mikimotoi, 効果, 赤潮, miyake, gymnodinium, 硫酸銅, kominami, Gymnodinium mikimotoi Miyake et Kominami n. sp. (MS.) |
| 2184 | Oda T., T. Akaike, K. Sato, A. Ishimatsu, S. Takeshita, T. Muramatsu, and H. Maeda. | 1992 | 赤潮一般 | Hydroxyl radical generation by red tide algae. | Archives of Biochemistry and Biophysics, 294(1), 38–43. | Hydroxyl radical generation by red tide algae, radical, tide, hydroxyl, algae, generation, red |
| 2185 | Oda T., A. Ishimatsu, M. Shimada, S. Takeshita, and T. Muramatsu. | 1992 | シャットネラ | Oxygen-radical-mediated toxic effects of the red tide flagellate <i>Chattonella marina</i> on <i>Vibrio alginolyticus</i> . | Marine Biology, 112(3), 505–509. | chattonella, alginolyticus, marina, Oxygen-radical-mediated toxic effects of the red tide flagellate Chattonella marina on Vibrio alginolyticus, vibrio, radical, tide, mediated, red, toxic, oxygen, effects, flagellate |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2186 | Oda T., D. Kim, A. Nakamura, T. Okamoto, N. Komatsu, T. Iida, A. Ishimatsu, and T. Muramatsu. | 2001 | シャットネラ | Involvement of NADPH oxidase-like enzyme in the production of superoxide anion by <i>Chattonella marina</i> . | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 312–315. | <i>Chattonella marina</i> /スーパー・オキサイド/酵素 |
| 2187 | Oda T., N. Komatsu, T. Muramatsu, A. Nonaka, Suminto, and K. Hirayama. | 2000 | 環境 | Detoxifying ability of marine bacterium <i>Flavobacterium</i> sp. against a toxic contaminant in the reagent sodium chloride to <i>Nannochloropsis oculata</i> . | Fisheries Science, 66(2), 241–248. | contamination/detoxification/ <i>Flavobacterium</i> sp./ <i>Nannochloropsis oculata</i> /reagent sodium chloride |
| 2188 | Oda T., A. Nakamura, T. Okamoto, A. Ishimatsu, and T. Muramatsu. | 1998 | シャットネラ・ヘテロシグマ | Lectin-induced enhancement of superoxide anion production by red tide phytoplankton. | Marine Biology, 131, 383–390. | |
| 2189 | Oda T., Y. Sato, D. Kim, T. Muramatsu, Y. Matsuyama, and T. Honjo. | 2001 | ヘテロカプサ | Species-specific hemolytic activity of <i>Heterocapsa circularisquama</i> , a newly identified harmful red tide dinoflagellate. | Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences, 2386, 69–78. | Species-specific hemolytic activity of <i>Heterocapsa circularisquama</i> , a newly identified harmful red tide dinoflagellate, tide, specific, dinoflagellate, heterocapsa, species, harmful, activity, hemolytic, red, identified, newly, circularisquama |
| 2190 | Oda T., Y. Sato, D. Kim, T. Muramatsu, Y. Matsuyama, and T. Honjo. | 2001 | ヘテロカプサ | Hemolytic activity of <i>Heterocapsa circularisquama</i> (Dinophyceae) and its possible involvement in shellfish toxicity. | Journal of Phycology, 37(4), 509–516. | <i>Heterocapsa circularisquama</i> /hemolysis/shellfish toxicity/harmful phytoplankton |
| 2191 | Oda T., Y. Sato, Y. Miyazaki, T. Muramatsu, Y. Matsuyama, and T. Honjo. | 2003 | ヘテロカプサ | Hemolytic toxin of <i>Heterocapsa circularisquama</i> as a possible causative factor responsible for shellfish kill. | HAB2002 | <i>Heterocapsa</i> |
| 2192 | Odebrecht C., M. E. Ferrario, Á. M. Ciotti, D. Kitzmann, M. O. P. Moreira, and F. Hinz. | 2001 | 珪藻 | The distribution of the diatom <i>Pseudo-nitzschia</i> off southern Brazil and relationships with oceanographic conditions. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 42–45. | <i>Pseudo-nitzschia</i> /ブラジル/海象/分布/ドウモイ酸 |
| 2193 | Odum H. T. and E. P. Odum. | 1955 | 環境 | Trophic structure and productivity of a windward coral reef community on eniwetok atoll. | Ecol. Monog., 25, 291–320. | trophic, reef, atoll, eniwetok, windward, productivity, community, coral, structure, Trophic structure and productivity of a windward coral reef community on eniwetok atoll |
| 2194 | 緒方武比古. | 2002 | 毒 | 麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻の成長・毒生産に関する生理生化学的研究. | Nippon Suisan Gakkaishi, 68(3), 309–312. | 麻ひ性貝毒原因渦鞭毛藻, 生理生化学的研究, 毒生産, 成長 |
| 2195 | Ogata T., T. Ishimaru, and M. Kodama. | 1987 | アレキサンドリウム | Effect of water temperature and light intensity on growth rate and toxicity change in <i>Protogonyaulax tamarensis</i> . | Marine Biology, 95(2), 217–220. | rate, temperature, change, light, Effect of water temperature and light intensity on growth rate and toxicity change in <i>Protogonyaulax tamarensis</i> , effect, toxicity, intensity, protogonyaulax, growth, water, tamarensis |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2196 | Ogata T. and M. Kodama. | 1986 | アレキサンドリウム | Ichthyotoxicity found in cultured media of <i>Protogonyaulax</i> spp. | Marine Biology, 92(1), 31–34. | found, ichthyotoxicity, Ichthyotoxicity found in cultured media of <i>Protogonyaulax</i> spp., <i>protogonyaulax</i> , media, spp., cultured |
| 2197 | Ogata T. and M. Kodama. | 1993 | 赤潮一般 | Peridinin-chlorophyll <i>a</i> -proteins of toxic dinoflagellates. | Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, T. J. Smayda and Y. Shimizu, editors, 901–905. | ペリディニン/タンパク質/有毒/渦鞭毛藻 |
| 2198 | Ogata T., M. Kodama, and T. Ishimaru. | 1989 | 毒 | Effect of water temperature and light intensity on growth rate and toxin production of toxic dinoflagellates. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 423–426. | 水温/光強度/増殖速度/毒生産/渦鞭毛藻 |
| 2199 | Ogata T., M. Kodama, K. Komaru, S. Sakamoto, S. Sato, and U. Simidu. | 1990 | 毒 | Production of paralytic shellfish toxins by bacteria isolated from toxic dinoflagellates. | Toxic Marine Phytoplankton, 311–315. | 有毒渦鞭毛藻/バクテリア/PSP生産 |
| 2200 | Ogata T., K. Koike, S. Nomura, and M. Kodama. | 1996 | アレキサンドリウム | Utilization of organic substances for growth and toxin production by <i>Alexandrium tamarense</i> . | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 343–346. | <i>Alexandrium tamarense</i> /増殖/毒/有機物質利用 |
| 2201 | 小川良徳. | 1974 | その他 | 魚礁研究私史. | 東海区水産研究所業績C集 さかな, 13, 18–21. | 史, 魚礁研究 |
| 2202 | 小川良徳. | 1974 | 環境 | 人工魚礁の機能. | 水産土木, 11(1), 5–8. | 人工魚礁, 機能 |
| 2203 | 小川良徳. | 1977 | 環境 | コンクリート魚礁の問題点. | セメント・コンクリート, 361, 8–14. | 問題点, コンクリート魚礁 |
| 2204 | 小川良徳. | 1978 | その他 | 人工魚礁の造成技術. | 78水産増養殖技術シンポジウム, 1–24. | 人工魚礁, 造成技術 |
| 2205 | Ogston A. G. | 1970 | アレロパシー | The biological functions of the glycosaminoglycans. | Chemistry and molecular biology of the intercellular matrix, 1231–1240. | functions, biological, The biological functions of the glycosaminoglycans, glycosaminoglycans |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2206 | Oguri M., D. Soule, D. M. Juge, and B. C. Abbott. | 1975 | 赤潮一般 | Red tides in the Los Angeles–Long Beach Harbor. | The First International Conference on Toxic Dinoflagellate Blooms, 41–46. | 赤潮/ロスアンゼルス |
| 2207 | Oh S. J., D-I. Kim, T. Sajima, Y. Shimasaki, Y. Matsuyama, Y. Oshima, T. Honjo, and H-S. Yang. | 2008 | ヘテロカプサ | Effects of irradiance of various wavelengths from light-emitting diodes on the growth of the harmful dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> and the diatom <i>Skeletonema costatum</i> . | Fisheries Science, 74(1), 137–145. | <i>Heterocapsa circularisquama</i> /irradiance/light wavelengths/light-emitting diode/ <i>Skeletonema costatum</i> |
| 2208 | Oh S. J., Y. Matsuyama, S. Nagai, S. Itakura, Y. H. Yoon, and H. S. Yang. | 2009 | アレキサンドリウム | Comparative study on the PSP component and toxicity produced by <i>Alexandrium tamarense</i> (Dinophyceae) strains occurring in Japanese coastal water. | Harmful Algae, 8(2), 362–368. | <i>Alexandrium tamarense</i> /paralytic shellfish toxin/toxicity/toxic components/Seto Inland Sea |
| 2209 | Oh S. J., Y. Matsuyama, S. Oda, T. Moriyama, and T. Uchida. | 2003 | ヘテロカプサ | Environmental feature causing a bloom of the novel dinoflagellate <i>Heterocapsa circularisquama</i> (Dinophyceae) in Uranouchi Bay, Kochi Prefecture, Japan. | Algae, 18(4), 1–10. | dissolved inorganic phosphorus (DIP)/dissolved organic phosphorus (DOP)/ <i>Heterocapsa circularisquama</i> /vertical migration/Uranouchi Bay |
| 2210 | 吳 碩津・松山幸彦・山本民次・中嶋昌紀・高辻英之・藤沢邦康. | 2005 | 赤潮一般 | 近年の瀬戸内海における有害・有毒渦鞭毛藻の分布拡大とその原因—溶存態有機リンの生態学的重要性. | 沿岸海洋研究, 43(1), 85–95. | 瀬戸内海/赤潮/溶存態無機リン(DIP)/溶存態無機窒素(DIN)/DIN:DIP比/溶存態有機リン(DOP)/珪藻/渦鞭毛藻 |
| 2211 | Oh S. J., D. S. Park, H. S. Yang, Y. H. Yoon, and T. Honjo. | 2007 | 環境 | Bioremediation on the benthic layer in polluted inner bay by promotion of microphytobenthos growth using light emitting diode (LED). | J. Korean. Soc. Mar. Environ. Engineer., 10, 93–101. | bioremediation/ <i>Nitzschia</i> sp./irradiance/wavelength/light emission diode/microphytobenthos |
| 2212 | Oh S. J., T. Yamamoto, Y. Kataoka, O. Matsuda, Y. Matsuyama, and Y. Kotani. | 2002 | カテナータム・アレキサンドリウム | Utilization of dissolved organic phosphorus by the two toxic dinoflagellates, <i>Alexandrium tamarense</i> and <i>Gymnodinium catenatum</i> (Dinophyceae). | Fisheries Science, 68(2), 416–424. | <i>Alexandrium tamarense</i> /alkaline phosphatase activity/dissolved inorganic phosphorus/dissolved organic phosphorus/ <i>Gymnodinium catenatum</i> |
| 2213 | Oh S. J., Y. H. Yoon, D-I. Kim, Y. Shimasaki, Y. Oshima, and T. Honjo. | 2006 | コクロディニウム | Optical characteristics in the growth of harmful dinoflagellate, <i>Cochlodinium polykrikoides</i> Margalef (Dinophyceae). | Algae, 21, 311–316. | growth/harmful dinoflagellate/ <i>Cochlodinium polykrikoides</i> /irradiance/wavelength |
| 2214 | Oh S. J., Y. H. Yoon, T. Yamamoto, and Y. Matsuyama. | 2005 | 環境 | Alkaline phosphatase activity and phosphatase hydrolyzable phosphorus for phytoplankton in Hiroshima Bay, Japan. | Ocean Science Journal, 40(4), 183–190. | Alkaline phosphatase/ <i>Alexandrium tamarense</i> / <i>Gymnodinium catenatum</i> /DIP/DOP/APHP |
| 2215 | 大貝政治・岩野英樹・星島正樹. | 1986 | 珪藻 | 珪藻 <i>Cylindrotheca closterium</i> (Ehrenberg) Reimann et Lewin の増殖に及ぼす環境諸要因の影響. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 52(9), 1635–1640. | cylindrotheca, lewin, closterium, 硅藻 <i>Cylindrotheca closterium</i> (Ehrenberg) Reimann et Lewin, 影響, 増殖, ehrenberg, reimann, 要因, 環境 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2216 | 大貝政治・樋田浩明・赤篠敬昭・中島和広・上田幸次・佐久間昌彦. | 1988 | 珪藻 | 珪藻 <i>Grammatophora marina</i> (Lyngb.) Kuetz. の増殖に及ぼす環境諸要因の影響. | Nippon Suisan Gakkaishi, 54(5), 795–799. | marina, grammaphora, 珪藻 <i>Grammatophora marina</i> (Lyngb.) Kuetz, 影響, 増殖, kuetz, lyngb, 要因, 環境 |
| 2217 | 大貝政治・塚原 博・松井敏夫・中島和広. | 1984 | 珪藻 | 珪藻 <i>Licmophora</i> の増殖に及ぼす環境諸要因の影響. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(7), 1157–1163. | 影響, 増殖, 珪藻 <i>Licmophora</i> , 要因, 環境, licmophora |
| 2218 | Ohizumi Y., M. Kobayashi, A. Kajiwara, and T. Yasumoto. | 1985 | 毒 | Potent excitatory effects of maitotoxin on cardiac and smooth muscle. | Elsevier Science Publishing Co., Inc. Toxic Dinoflagellates, Anderson, White, and Baden, Editors, 369–374. | マイトキシン/平滑筋/興奮伝達 |
| 2219 | 大塚 攻・遠部 卓. | 1990 | 環境 | 大阪湾、紀伊水道における浮遊性カイアシ類の藻類に対する摂餌生態. | 昭和63・64(平成元)年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書 赤潮鞭毛藻と植食性動物プランクトンの相互作用に関する研究, 35–53. | 浮遊性カイアシ類, 藻類, 紀伊水道, 餌生態, 大阪湾 |
| 2220 | 大和田紘一. | 1971 | 環境 | 海水中のビタミン類. | 月刊 海洋科学, 3, 516–520. | 海水, ビタミン類 |
| 2221 | Ohwada K. | 1972 | 環境 | Bioassay of biotin and its distribution in the sea. | Marine Biology, 14(1), 10–17. | distribution, biotin, sea, bioassay, Bioassay of biotin and its distribution in the sea |
| 2222 | Ohwada K. | 1975 | 環境 | Agar plate method for detection and enumeration of alkylbenzenesulfonate-degrading microorganisms. | Applied Microbiology, 29(1), 40–43. | enumeration, degrading, detection, method, Agar plate method for detection and enumeration of alkylbenzenesulfonate-degrading microorganisms, agar, plate, alkylbenzenesulfonate, microorganisms |
| 2223 | 大和田紘一. | 1986 | 環境 | 5.2 好圧細菌. | 内藤敦編「海洋生物資源の探索と利用－未利用微生物・動植物の探索と育種」, EME出版社, 83–93. | 圧細菌 |
| 2224 | 大和田紘一. | 1993 | 環境 | 深海微生物の生態と圧力に対する応答. | 凍結及び乾燥研究会会誌, 39, 73–76. | 生態, 深海微生物, 圧力, 応答 |
| 2225 | 大和田紘一. | 1994 | 環境 | V-5. 熱床生物. | 日本水産学会出版委員会編「現代の水産学」水産学シリーズ100号, 恒星社厚生閣, 204–211. | 熱床生物 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|--------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2226 | 大和田紘一. | 1995 | 環境 | 富栄養化沿岸域の有機物分解に果たす微生物の役割. | ヘドロ, 64, 1-11. | 役割, 富栄養化沿岸域, 有機物分解, 微生物 |
| 2227 | 大和田紘一. | 1997 | 環境 | 海洋微生物の特性、多様性とその利用. | 日本海水学会誌, 51(5), 309-313. | 多様性, 海洋微生物, 特性, 利用 |
| 2228 | 大和田紘一. | 2002 | 環境 | 海洋微生物の生態－海洋深層水との関連で－. | 沿岸海洋研究, 40(1), 29-35. | 深層水/海洋微生物/分布/多様性/安全性 |
| 2229 | 大和田紘一・深見公雄・本城凡夫・山田久・大嶋雄治. | 2003 | 環境 | 水圏環境の研究. | 日本水産学会誌, 69, 113-123. | 水圏環境, 研究 |
| 2230 | Ohwada K., M. Otsuhata, and N. Taga. | 1972 | 環境 | Seasonal cycles of vitamin B ₁₂ , thiamine and biotin in the surface water of Lake Tsukui. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 38(8), 817-823. | seasonal, lake, biotin, cycles, seasonal cycles of vitamin B12, b12, surface, tsukui, thiamine, vitamin, thiamine and biotin in the surface water of Lake Tsukui, water |
| 2231 | 大和田紘一・清水 潮・多賀信夫. | 1981 | 環境 | イオン交換膜製塩各工程における海水中の懸濁態有機成分ならびに微生物について. | 日本海水学会誌, 34(6), 359-366. | 海水, イオン交換膜製塩, 工程, 態有機成分, 微生物 |
| 2232 | 大和田紘一・清水 潮・多賀信夫. | 1981 | 環境 | イオン交換膜に付着する微生物ならびに有機物について. | 日本海水学会誌, 34(6), 367-372. | 有機物, 微生物, イオン交換膜 |
| 2233 | Ohwada K., P. S. Tabor, and R. R. Colwell. | 1980 | 環境 | The use of small culture tubes for testing microbial viability and growth under high hydrostatic pressure. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 46(10), 1293. | testing, pressure, small, viability, The use of small culture tubes for testing microbial viability and growth under high hydrostatic pressure, microbial, tubes, hydrostatic, culture, high, use, growth |
| 2234 | Ohwada K., P. S. Tabor, and R. R. Colwell. | 1980 | 環境 | Species composition and barotolerance of gut microflora of deep-sea benthic macrofauna collected at various depths in the Atlantic Ocean. | Applied and Environmental Microbiology, 40(4), 746-755. | barotolerance, deep, microflora, collected, depths, composition, various, sea, species, ocean, gut, macrofauna, benthic, atlantic, Species composition and barotolerance of gut microflora of deep-sea benthic macrofauna collected at various depths in the Atlantic Ocean |
| 2235 | Ohwada K. and N. Taga. | 1969 | 環境 | Distribution of vitamin B ₁₂ , thiamine and biotin in marine sediments. | Journal of the Oceanographical Society of Japan, 25(3), 123-136. | distribution, biotin, sediments, distribution of vitamin B12, marine, b12, thiamine and biotin in marine sediments, thiamine, vitamin |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2236 | Ohwada K. and N. Taga. | 1972 | 環境 | Vitamin B ₁₂ , thiamine, and biotin in Lake Sagami. | Limnology and Oceanography, 17(2), 315–320. | lake, biotin, thiamine, and biotin in Lake Sagami, sagami, b12, thiamine, vitamin B12, vitamin |
| 2237 | Ohwada K. and N. Taga. | 1973 | 環境 | Seasonal cycles of vitamin B ₁₂ , thiamine and biotin in Lake Sagami. Patterns of their distribution and ecological significance. | Int. Revue Ges. Hydrobiol., 58(6), 851–871. | thiamine and biotin in Lake Sagami patterns of their distribution and ecological significance, seasonal, distribution, lake, biotin, cycles, sagami, ecological, seasonal cycles of vitamin B12, b12, patterns, thiamine, significance, vitamin |
| 2238 | Ohwada K. and H. Uemoto. | 1988 | アコヤガイ | Environmental conditions in pearl oyster culture grounds in Japan. | Environmental quality and aquaculture systems. NOAA Tech. Rep. NMFS69, Natl. Mar. Fish. Serv., Seattle, WA 98115, 45–50. | oyster, Environmental conditions in pearl oyster culture grounds in Japan, conditions, japan, grounds, culture, environmental, pearl |
| 2239 | 岡慎一郎. | 1998 | 環境 | 南西諸島の河口域における汽水環境と動物プランクトン. | 日本プランクトン学会誌, 45(1), 21–23. | 南西諸島/汽水環境/動物プランクトン/カイアシ類 |
| 2240 | 岡田弥一郎. | 1934 | 赤潮一般 | 赤潮. | 植物及動物, 2(4), 690–696. | 赤潮 |
| 2241 | 岡田知也・中山恵介. | 2004 | 環境 | 荒川河口域における潮差変動に伴う Chlorophyll <i>a</i> 分布および河川流入負荷量の変動. | 土木学会論文集, 754(II-66), 33–50. | river mouth/tidal range/mixing type/nutrient load/chlorophyll <i>a</i> |
| 2242 | Okada T., T. Shikata, and T. Honjo. | 2008 | 珪藻 | Thin-layer bloom of diatoms around the mouth of the Arakawa River in Tokyo Bay. | J. Fac. Agr., Kyushu Univ., 53(1), 73–80. | around, river, layer, arakawa, mouth, bay, Thin-layer bloom of diatoms around the mouth of the Arakawa River in Tokyo Bay, diatoms, bloom, tokyo, thin |
| 2243 | 岡市友利. | 1971 | 赤潮一般 | 瀬戸内海の汚染と赤潮. | 化学と生物, 9, 566–571. | 赤潮, 瀬戸内海, 汚染 |
| 2244 | 岡市友利. | 1978 | 赤潮一般 | 赤潮プランクトンの増殖および抑制に関する化学的要因. | 生物の制御機構 化学増刊, 75, 149–165. | 抑制, 赤潮プランクトン, 増殖, 化学的要因 |
| 2245 | 岡市友利. | 1979 | 赤潮一般 | 培養中にみられる鞭毛藻類のパッチ形成について. | 月刊 海洋科学, 11(8), 650–654. | 鞭毛藻類, パッチ形成, 培養 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2246 | 岡市友利. | 1979 | 赤潮一般 | 赤潮研究の動向. | 学術月報, 31(10), 529-533. | 赤潮研究, 動向 |
| 2247 | 岡市友利. | 1980 | 赤潮一般 | 魚貝類の被害防止策. | 水産学シリーズ34, 赤潮-発生機構と対策, 日本水産学会編, 124-138. | 魚貝類, 被害防止策 |
| 2248 | 岡市友利. | 1980 | 赤潮一般 | 瀬戸内海底泥中の可溶性有機物とその鞭毛藻に対する作用. | 海と空, 56(2-3), 93-105. | 鞭毛藻, 瀬戸内海底泥中, 可溶性有機物, 作用 |
| 2249 | 岡市友利. | 1980 | 赤潮一般 | <p>赤潮研究の現状と動向に関するシンポジウム講演要旨集. I 会員のあいさつ. 丸茂隆三(東大・海洋研). II 赤潮に関する環境科学特別研究について. 岡市友利(香川大・農). III 赤潮鞭毛藻類の増殖特性と赤潮形成のメカニズム. 高橋正征(筑波大・生物科学)・藤田善彦(東大・海洋研). IV <i>Zygapikodinium</i> および <i>Peridinium</i> のシスト形成について. 福代康夫(北里大・水産). V 赤潮発生環境に関する研究の現状. V-1 東京湾における赤潮研究. 丸茂隆三(東大・海洋研)・村野正昭(東水大)・有賀祐勝(東水大)・古谷 研(東大・海洋研). V-2 浜名湖における赤潮研究. 平野礼次郎(東大・農)・渡辺研太郎(極地研). V-3 伊勢湾における赤潮研究. 安達六郎(三重大・水産). V-4 舞鶴湾における赤潮発生環境に関する研究. 川合英夫(京大・農). V-5 播磨灘における赤潮研究. 1) 赤潮発生状況. 岡市友利・越智 正(香川大・農). 2) 植物プランクトンの分布・栄養塩. 遠藤拓郎・小山治行(広大・生物生産). 3) B群ビタミン類および從属栄養細菌の分布. 炜 幸彦・西島敏隆(高知大・農). 4) クロロフィル量等の時間的変動について. 福岡二郎(北大・水産). 5) 播磨灘の流動と赤潮の発生. 深瀬 茂(北大・水産). 6) 夏期底層の冷水塊の形成と消滅. 柳 哲雄・樋口明生(愛媛大・工). VI 赤潮発生予察に関する研究. VI-1 汚染と赤潮発生(洞海湾) 赤潮生物コクス排水に対する生長反応について. 鶴田新生(水大校)・山田真知子(北九州環衛研). VI-2 大村湾における <i>Gymnodinium</i> の群生長速度と発生予察. 飯塚昭二(長崎大・水産). VI-3 <i>Gymnodinium'65</i> 年型種の増殖と促進因子. 平山和次・村松 誠(長崎大・水産). VI-4 鹿児島湾における <i>Chattonella</i> 発生予察. 野沢治治(鹿児島大・水産).</p> | 東京大学海洋研究所, 1-17. | 生物科学, 栄養塩, 北里大, 農, 筑波大, 赤潮発生環境, <i>chattonella</i> , の変動, <i>Gymnodinium'65</i> , 京大, 哲雄, 山田真知子, 渡辺研太郎, 赤潮生物コクス排水, 東大, 茂, 流動形成, 野沢治治, 幸彦, 越智, あいさつ, 高橋正征, 北大, 小山治, 浜名湖, <i>zygapikodinium</i> , 舞鶴湾, 岡市友利, 赤潮, 平野礼次郎, 分布, 福岡二郎, 正, 生物生産, 従属栄養細菌, 鹿児島大, 三重大, 福代康夫, 大村湾, 赤潮形成, 開会, 丸茂隆三, 遠藤拓郎, 増殖, 赤潮発生環境, 北九州環衛研, 飯塚昭二, 香川大, 炜, 有賀祐勝, シスト形成, 海洋研, 赤潮研究, 水産, 夏期底層, 古谷, 洞海湾, <i>peridinium</i> , 村野正昭, 伊勢湾, 消滅, 群生長速度, 研究, 樋口明生, <i>gymnodinium</i> , <i>Peridinium</i> , 赤潮, 水大校, 発生, 安達六郎, 赤潮鞭毛藻類, 赤潮発生, 播磨灘, 西島敏隆, <i>Zygapikodinium</i> , 藤田善彦, 高知大, クロロフィル量, メカニズム, 長崎大, 動向, 赤潮発生予察, 冷水塊, 細, B群ビタミン類, 深瀬, 鹿児島湾, 赤潮発生状況, 増殖特性, 型種, 村松, 促進因子, 柳, シンポジウム講演要旨集, 現状, 研, 愛媛大, 生長反応, <i>Chattonella</i> 発生予察, 東京湾, 植物プランクトン, 発生予察, 川合英夫, 汚染, 極地研, <i>Gymnodinium</i> , 環境科学特別研究, 鶴田新生, 平山和次, 東水大 |
| 2250 | 岡市友利. | 1982 | 淡水赤潮 | 相模湾に発生した <i>Peridinium Polonicum</i> による淡水赤潮の毒生について. | 国立公害研究所研究資料, 24, 9-14. | 相模湾, <i>polonicum</i> , 毒生, <i>peridinium</i> , <i>Peridinium Polonicum</i> , 淡水赤潮 |
| 2251 | 岡市友利. | 1982 | アレロパシー | 対話「プランクトン生産物」-生態系における役割-. | 月刊 海洋科学, 14(1), 4-11. | プランクトン生産物, 対話, 役割, 生態系 |
| 2252 | 岡市友利. | 1988 | 赤潮一般 | 赤潮シンポジウムの成果. | 養殖, 53p. | 赤潮シンポジウム, 成果 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|------------|------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2253 | Okaichi T. | 1989 | 赤潮一般 | Red tide problems in the Seto Inland Sea, Japan. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 137-142. | 赤潮/瀬戸内海 |
| 2254 | 岡市友利. | 1992 | 赤潮一般 | 赤潮は地球環境問題である. | 水情報, 12(1), 9-11. | 赤潮/養殖/貝毒/富栄養化/プランクトン |
| 2255 | 岡市友利. | 1995 | 赤潮一般 | 日本の赤潮研究とその国際的役割. | 学術月報, 48(2), 134-139. | 日本, 赤潮研究, 国際的役割 |
| 2256 | 岡市友利. | 1996 | 赤潮一般 | 瀬戸内海の赤潮40年. | 瀬戸内海, 7・8, 22-36. | 赤潮, 瀬戸内海 |
| 2257 | Okaichi T. | 1997 | 赤潮一般 | Red tides in the Seto Inland Sea. | Sustainable Development in the Seto Inland Sea, Japan. - From the Viewpoint of Fisheries, 251-304. | tides, inland, Red tides in the Seto Inland Sea, sea, red, seto |
| 2258 | 岡市友利. | 1997 | 環境 | 石油流出事故による海洋汚染の機構. | 水環境学会誌, 20(10), 632-638. | 石油流出事故, 機構, 海洋汚染 |
| 2259 | 岡市友利. | 1997 | 環境 | 新瀬戸内海圏域の環境グランドデザインへの提言へ向けて. | 香川経済同友会会報, 49, 新春特集号, 22-35. | 提言, 瀬戸内海圏域, 環境グランドデザイン |
| 2260 | 岡市友利. | 1997 | 赤潮一般 | 赤潮の科学(第二版). | 恒星社厚生閣, 337p. | 赤潮, 科学 |
| 2261 | 岡市友利. | 2002 | 赤潮一般 | 赤潮発生に関する化学的諸問題. | 第3回地共センター・セミナー瀬戸内海環境保全シンポジウム2002「産学官連携による環境修復に向けて」, 香川大学工学部, 香川大学地域開発共同研究センター, 1-6. | 赤潮発生 |
| 2262 | 岡市友利. | 2002 | 環境 | 豊島の不法投棄産業廃棄物等の処理と環境保全. | 2002年度関西土壤肥料協議会講演要旨集「環境汚染とバイオリメディエーション」, 1-9. | 不法投棄産業廃棄物, 豊島, 環境保全, 処理 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2263 | Okaichi T. | 2003 | 赤潮一般 | Introduction. | Red Tides, ed. T. Okaichi, 1-6. | 諸言/まえがき |
| 2264 | Okaichi T. | 2003 | 赤潮一般 | Red-tide phenomena. 2.1 Definition of red tides. 2.2 The present situation of red-tide research and future problems. 2.3 Historical records on red tides. 2.3.1 The old records. 2.3.2 Red-tide studies in Japan. 2.4 International study program on red tides. 2.5 Recent outbreaks of red tides in Japan. 2.5.1 Tokyo Bay. 2.5.2 Ise Bay and adjacent water areas. 2.5.3 The Seto Inland Sea. 2.5.4 Ohmura Bay, Kagoshima Bay and the coastal area a Kyushu Island. | Red Tides, ed. T. Okaichi, 7-60. | 日本の赤潮 |
| 2265 | 岡市友利. | 2003 | 赤潮一般 | 赤潮と瀬戸内海に関する小論集. | 香川大学. | 論集, 赤潮, 瀬戸内海 |
| 2266 | 岡市友利. | 2003 | 環境 | 瀬戸内海の環境をめぐる諸問題とその将来. | 沿岸域, 15(2), 4-7. | 瀬戸内海, 環境 |
| 2267 | 岡市友利・畠 幸彦・遠藤拓郎. | 1979 | 淡水赤潮 | “湖沼の水の華(いわゆる淡水赤潮)の発生に関する諸問題”シンポジウム. はじめに 1. 淡水プランクトンの特性について、根来健一郎(近畿大農). 2. 西日本における淡水赤潮の発生状況、伊藤猛夫(愛媛大理). 3. ダム湖における淡水赤潮の発生機構、畠 幸彦・近森邦英(高知大農). 4. 琵琶湖における淡水赤潮の発生機構、門田 元(京都大農). 5. 淡水赤潮の水産業および公衆衛生に及ぼす影響、岡市友利(香川大農). | 日本プランクトン学会報, 26(2), 110-122. | 公衆衛生、近畿大農、幸彦、琵琶湖、京都大農、水、岡市友利、愛媛、湖沼、根来健一郎、影響、淡水プランクトン、シンポジウム、香川大農、畠、ダム湖、門田、近森邦英、理、西日本、発生状況、発生機構、発生、高知大農、伊藤猛夫、特性、華、水産業、淡水赤潮 |
| 2268 | Okaichi T., and T. Honjo. | 1999 | 赤潮一般 | Recent transition of red tides problems in the Seto Inland Sea, Japan. | MEDCOAST99-EMECS99 Joint Conference, 1239-1246. | Seto Inland Sea/red tide/ <i>Chattonella</i> / <i>Gymnodinium</i> / <i>Heterocapsa</i> / <i>Heterosigma</i> / <i>Noctiluca</i> |
| 2269 | 岡市友利・本城凡夫・福代康夫. | 1987 | 赤潮一般 | 赤潮種と発生環境. | 昭和61年度 文部省科学研究費による特別研究「環境科学」研究報告書「沿岸生態系の遷移と環境の海域特性」赤潮の科学, 211-253. | 発生環境, 赤潮種 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2270 | Okaichi T., T. Honjo, Y. Fukuyo, Y. Matsuyama, and T. Uchida. | 2003 | シャツネラ・ミキモトイ・ヘテロシグマ・ディノフィシス・ヘテロカブサ | <p>Red-tide species and the environmental conditions. 6.1 <i>Chattonella</i> spp. (Okaichi T.) 6.1.1 The cause of fish mortality due to <i>Chattonella antiqua</i>. 6.2 <i>Heterosigma akashiwo</i>. (Honjo T.) 6.2.1 Growth process for red-tide formation. 6.2.2 Areas of occurrence and flow conditions. 6.2.3 Water temperature and salinity. 6.2.4 Macronutrients: Nitrogen and phosphorus. 6.2.5 Microconstituents. 6.2.6 Accumulation during the daytime. 6.3 <i>Karenia</i> (formerly <i>Gymnodinium</i>) <i>mikimotoi</i>. (Honjo T.) 6.3.1 Overview. 6.3.2 Areas and season of blooming. 6.3.3 Growth process and life cycle. 6.3.4 Orientated layer of population in the daytime, and the diurnal vertical migration. 6.3.5 Temperature, salinity and other factors. 6.3.6 Precipitation and anoxic bottom water. 6.3.7 Growth promoting substances. 6.3.8 Mechanism of wide-ranged blooming. 6.4 <i>Dinophysis</i>. (Fukuyo Y.) 6.4.1 Physiological characteristics. 6.4.2 Ecological characteristics. 6.5 <i>Alexandrium</i>. (Fukuyo Y.) 6.5.1 Historical background. 6.5.2 Ecology. 6.6 <i>Heterocapsa circularisquama</i>. (Matsuyama Y., T. Uchida, and T. Honjo.) 6.6.1 Occurrences and fisheries damages due to <i>Heterocapsa circularisquama</i>. 6.6.2 Environmental conditions causing <i>Heterocapsa circularisquama</i> bloom. 6.6.3 Fisheries damage.</p> | Red Tides, ed. T. Okaichi, 323–393. | 赤潮/環境条件 |
| 2271 | Okaichi T. and Y. Imatomi. | 1979 | プロロセントラム | Toxicity of <i>Prorocentrum minimum</i> var. <i>mariae-lebouriae</i> assumed to be a causative agent of short-necked clam poisoning. | Toxic Dinoflagellate Blooms, 385–388. | <i>Prorocentrum minimum</i> var. <i>mariae-lebouriae</i> /毒/アサリ |
| 2272 | Okaichi T., S. Montani, J. Hiragi, and A. Hasui. | 1989 | シャツネラ | The role of iron in the outbreaks of <i>Chattonella</i> red tide. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 353–356. | <i>Chattonella</i> /赤潮/Fe |
| 2273 | 岡市友利・西尾幸郎. | 1976 | 毒 | II 赤潮プランクトンの毒性. | 大規模有害赤潮発生の早期予知及び被害防除に関する調査研究報告書, 101–111. | 赤潮プランクトン, 毒性 |
| 2274 | 岡市友利・龍満 鑿. | 2002 | 赤潮一般 | 大日本史の赤潮とみられる記録の原記載について. | 瀬戸内海, 29(4), 6–48. | 記載, 赤潮, 日本史, 記録 |
| 2275 | 岡市友利・山崎 誠・西尾幸郎・越智 正・多田邦尚・片山信吾. | 1998 | 赤潮一般 | UV-A 領域の紫外部吸収物質の赤潮生物における存在とその役割. | 日本海水学会誌, 52(4), 236–242. | 役割, 存在, 赤潮生物, UV-A領域, 紫外部吸収物質 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2276 | 岡本 研. | 1995 | 赤潮一般・環境 | 浜名湖の植物プランクトン: 汽水性の強い内湾の事例として. | 水産海洋研究, 59(2), 175-179. | 内湾, 浜名湖, 事例, 植物プランクトン, 汽水性 |
| 2277 | Okamoto K. and R. Hirano. | 1989 | 赤潮一般 | Growth responses of natural populations of red tide organisms to nutrient enrichment. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 233-236. | 赤潮/増殖/栄養添加 |
| 2278 | 岡村金太郎. | 1911 | 赤潮一般 | 赤潮に就いて. | 水産研究誌, 6(1), 4-12. | 赤潮 |
| 2279 | 岡村金太郎. | 1912 | 赤潮一般 | 赤潮ニ就テ. | 植物学雑誌, 25(288), 1-9. | 赤潮ニ就テ |
| 2280 | 岡村金太郎. | 1916 | 赤潮一般 | 赤潮ニ就イテ. | 水産講習所試験報告, 12, 26-41. | 赤潮ニ就イテ |
| 2281 | 岡山県・兵庫県・大阪府・和歌山県・徳島県・香川県・株式会社富士総合研究所. | 1991 | シャットネラ | 平成2年度 赤潮対策技術開発試験シャットネラ赤潮被害防止技術開発試験. | 東部瀬戸内海シャットネラ赤潮総合解析報告書, 1-144. | 赤潮対策技術開発試験シャットネラ赤潮被害防止技術開発試験, 平成 |
| 2282 | Okolodkov Y. B., F. C. Merino-Virgilio, J. A. Herrera-Silveira, S. Espinosa-Matías, and M. L. Parsons. | 2009 | ガンビエール | <i>Gambierdiscus toxicus</i> in the southeastern Gulf of Mexico. | Harmful Algae News, 40, 12-14. | |
| 2283 | 大久保勝夫. | 1979 | 環境 | 水質部の歩み. | 東海区水産研究所業績C集 さかな, 23, 60-62. | 水質部, 歩み |
| 2284 | Okubo A. and J. Slater. | 1989 | 赤潮一般 | Simple model of eelgrass growth and water quality: Another catastrophe theory? | Novel Phytoplankton Blooms, 693-712. | モデル/アマモ/増殖/水質 |
| 2285 | Okumura M., S. Yamada, N. Ishikawa, M. Ishida, N. Kuwada, and Y. Oshima. | 1996 | アレキサンドリウム | Characteristics of paralytic shellfish poisons derived from <i>Alexandrium tamarense</i> and short-necked clams in Mikawa Bay, Aichi, Japan. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 523-526. | PSP/ <i>Alexandrium tamarense</i> /アサリ/三河湾 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2286 | Oliveira L., T. Bisalputra, and N. J. Antia. | 1980 | アレロパシー | Ultrastructural observation of the surface coat of <i>Dunaliella tertiolecta</i> from staining with cationic dyes and enzyme treatments. | New Phytol., 85(3), 385–392. | coat, cationic, treatments, ultrastructural, observation, surface, tertiolecta, dunaliella, Ultrastructural observation of the surface coat of Dunaliella tertiolecta from staining with cationic dyes and enzyme treatments, enzyme, staining, dyes |
| 2287 | Olsen P. S. | 1989 | ブラウンタイプ | Development and distribution of a brown-water algal bloom in Barnegat Bay, New Jersey with perspective on resources and other red tides in the region. | Novel Phytoplankton Blooms, 189–212. | brown tide/赤潮/ニュージャージー州 |
| 2288 | Olsson P. and E. Granéli. | 1991 | 赤潮一般 | Observations on diurnal vertical migration and phased cell division for three coexisting marine dinoflagellates. | Journal of Plankton Research, 13(6), 1313–1324. | observations, division, marine, dinoflagellates, Observations on diurnal vertical migration and phased cell division for three coexisting marine dinoflagellates, diurnal, vertical, three, phased, cell, migration, coexisting |
| 2289 | Onbé T. | 1985 | 環境 | Seasonal fluctuations in the abundance of populations of marine cladocerans and their resting eggs in the Inland Sea of Japan. | Marine Biology, 87(1), 83–88. | seasonal, eggs, inland, populations, abundance, Seasonal fluctuations in the abundance of populations of marine cladocerans and their resting eggs in the Inland Sea of Japan, marine, resting, sea, japan, fluctuations, cladocerans |
| 2290 | Onbé T. | 1991 | 生活環 | Some aspects of the biology of resting eggs of marine cladocerans. | Crustacean Egg Production, 7, 41–55. | eggs, biology, marine, aspects, resting, cladocerans, Some aspects of the biology of resting eggs of marine cladocerans |
| 2291 | Onbé T., T. Hotta, and S. Ohtsuka. | 1988 | 環境 | The developmental stages of the marine calanoid copepod <i>Labidocera rotunda Mori</i> . | J. Fac. Appl. Biol. Sci. Hiroshima Univ., 27(2), 79–91. | calanoid, The developmental stages of the marine calanoid copepod <i>Labidocera rotunda Mori</i> , rotunda, labidocera, developmental, marine, mori, stages, copepod |
| 2292 | Onbé T. and Y. Kimoto. | 1985 | 環境 | Growth and reproduction of <i>Longipedia</i> sp. (Copepoda: Harpacticoida) in laboratory cultures. | Special Publication of the Mukaishima Marine Biological Station, 205–212. | reproduction, longipedia, copepoda, harpacticoida, Growth and reproduction of <i>Longipedia</i> sp. (Copepoda: Harpacticoida) in laboratory cultures, cultures, laboratory, growth |
| 2293 | O'Neill S., S. Gallacher, and I. Riddoch. | 1998 | 毒 | Assessment of a saxitoxin elisa as a pre-screen for PSP toxins in <i>Mytilus edulis</i> and <i>Pecten maximus</i> , from UK waters. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 551–553. | アセメント/サキシトキシン/PSP/毒/イガイ/イギリス |
| 2294 | 鬼塚 剛・青木一弘・清水 学・松山幸彦・木元克則・松尾 斎・末代勇樹・西 広海・田原義雄・櫻田清成。 | 2011 | シャットネラ | 2010年夏季に八代海で発生した <i>Chattonella antiqua</i> 赤潮の短期動態 —南部海域における出現特性— | 水産海洋研究, 75(3), 143–153. | <i>Chattonella antiqua</i> /harmful bloom/Yatsushiro Sea/Kuma River/low salinity water/density-driven current |
| 2295 | 鬼塚 剛・柳 哲雄・門谷 茂・山田真知子・上田直子・鈴木 學。 | 2002 | 環境 | ムラサキイガイ養殖による洞海湾浄化の試み。 | 海の研究, 11(3), 403–417. | 数値生態系モデル/ムラサキイガイ/赤潮/貧酸素水塊/窒素除去 |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2296 | 鬼塚正光. | 1989 | 環境 | 東京湾の貧酸素水塊. | 沿岸海洋研究ノート, 26(2), 99–100. | 貧酸素水塊, 東京湾 |
| 2297 | Onji M., S. Nakano, and S. Suzuki. | 2003 | ミキモトイ | Virus-like particles suppress growth of the red-tide-forming marine dinoflagellate <i>Gymnodinium mikimotoi</i> . | Marine Biotechnology, 5, 435–442. | <i>Gymnodinium mikimotoi</i> /virus/red tide |
| 2298 | 生地暢・澤辺智雄・絵面良男. | 1995 | ミキモトイ | 赤潮藻類 <i>Gymnodinium mikimotoi</i> の増殖に及ぼす田辺湾分離細菌の影響. | 北海道大学水産学部研究彙報, 46(2), 39–46. | 海洋細菌/ <i>Gymnodinium mikimotoi</i> /赤潮/混合培養 |
| 2299 | Onji M., T. Sawabe, and Y. Ezura. | 1999 | アレキサンドリウム | Growth suppression of the marine phytoplankton <i>Alexandrium catenella</i> and <i>Tetraselmis</i> sp. caused by ultrafiltrated seawater collected from coastal area on the mouth of Funka Bay. | Fisheries Science, 65(5), 687–693. | phytoplankton/ <i>Alexandrium catenella</i> / <i>Tetraselmis</i> sp./growth suppression/filtrable pathogens |
| 2300 | Onji M., T. Sawabe, and Y. Ezura. | 2000 | 環境 | Characteristics of virus-like growth suppression agents against phytoplankton obtained from seawater at the mouth of Funka Bay, Hokkaido, Japan. | Fisheries Science, 66(1), 38–43. | <i>Alexandrium catenella</i> /growth suppression/ <i>Gymnodinium mikimotoi</i> /proteinase sensitivity/ <i>Tetraselmis</i> sp./ultracentrifugation |
| 2301 | Onji M., T. Sawabe, and Y. Ezura. | 2000 | 環境 | An evaluation of viable staining dyes suitable for marine phytoplankton. | Bulletin of the Faculty of Fisheries, Hokkaido University, 51(3), 153–157. | Marine phytoplankton/Viable staining/Neutral red/Evans blue/Fluorescein diacetate |
| 2302 | Onji M., T. Sawabe, and Y. Ezura. | 2001 | アレキサンドリウム | Purification of a virus-like particle causing growth suppression of <i>Alexandrium catenella</i> . | Bulletin of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 52(3), 135–138. | <i>Alexandrium catenella</i> /growth suppression/virus particle/purification/RNA virus |
| 2303 | 小野知足. | 1988 | シャットネラ・ヘテロシグマ | 播磨灘における赤潮生物の細胞周期と群成長速度. | 香川県赤潮研究所研究報告, 3, 1–67. | |
| 2304 | Ono C. | 1989 | シャットネラ | Cell cycle and growth rate of <i>Chattonella antiqua</i> (Hada) ono during red tides. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 313–314. | <i>Chattonella antiqua</i> /増殖速度/年間サイクル/赤潮 |
| 2305 | Ono K., O. Arakawa, Y. Onoue, S. Matsumoto, H. Shihara, K. Takeda, M. Nakanishi, T. Yamaji, K. Uemura, and Y. Ogawa. | 1998 | 赤潮一般 | Synthetic surfactants for protecting cultured fish against toxic phytoplankton. | Aqua. Res., 29, 569–572. | surfactants, synthetic, fish, protecting, phytoplankton, Synthetic surfactants for protecting cultured fish against toxic phytoplankton, cultured, toxic |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2306 | Ono K., S. Khan, and Y. Onoue. | 2000 | ヘテロシグマ | Effect of temperature and light intensity on the growth and toxicity of <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae). | Aqua. Res., 31(5), 427–431. | Effect of temperature and light intensity on the growth and toxicity of <i>Heterosigma akashiwo</i> (Raphidophyceae), temperature, light, heterosigma, effect, toxicity, intensity, growth, raphidophyceae, akashiwo |
| 2307 | Ono C. and H. Takano. | 1980 | シャットネラ | <i>Chattonella antiqua</i> (Hada) comb. nov., and its occurrence on the Japanese coast. | Bull. Tokai Reg. Fish. Res. Lab., 102, 93–100. | |
| 2308 | Ono C., S. Yoshimatsu, and S. Matsuoka. | 1996 | 赤潮一般 | Monitoring system of harmful and toxic phytoplankton in Kagawa Prefecture, Japan. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 23–25. | 日本/香川県/有害藻類/モニタリング |
| 2309 | 小野知足・吉松定昭・松岡 聰・吉田陽一. | 2000 | シャットネラ・ミキモトイ | 播磨灘南部におけるギムノディニウムおよびシャットネラの潮流による集積. | Nippon Suisan Gakkaishi, 66(1), 118–119. | 播磨灘/シャットネラ/ギムノディニウム/潮流/集積 |
| 2310 | 小野秀昭・吉松定昭・鳥海三郎. | 1999 | 赤潮一般 | 日本沿岸域の底生渦鞭毛藻類の観察記録. | 藻類, 47, 11–21. | armoured/unarmoured/benthic dinoflagellates/intertidal pool/new flora/periphyton/sand/dwelling |
| 2311 | 小野知足・吉松定昭・吉田陽一. | 1999 | シャットネラ | 播磨灘南西における <i>Chattonella antiqua</i> の高密度発生と水質、気象要因等との関係. | Nippon Suisan Gakkaishi, 65(4), 665–672. | 播磨灘/シャットネラ/DIN × DIP/DIN : DIP比/気象 |
| 2312 | Onodera H., Y. Oshima, M. F. Watanabe, M. Watanabe, C. J. Bolch, S. Blackburn, and T. Yasumoto. | 1996 | 淡水赤潮 | Screening of paralytic shellfish toxins in freshwater cyanobacteria and chemical confirmation of the toxins in cultured <i>Anabaena circinalis</i> from Australis. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 563–566. | <i>Anabaena circinalis</i> /毒/淡水産/PSP/スクリーニング |
| 2313 | 小野寺丈尚太郎・高橋孝三・本多牧生. | 2003 | 珪藻 | 北西太平洋 Station KNOT における珪藻殻フラックス. | 日本プランクトン学会報, 50(1), 1–15. | sediment trap(セディメントトラップ)/diatom(珪藻)/resting spore(休眠孢子)/Station KNOT/coastal water(沿岸水) |
| 2314 | Onoue Y., M. S. Hag, and K. Nozawa. | 1990 | シャットネラ | Separation of neurotoxins from <i>Chattonella marina</i> . | Nippon Suisan Gakkaishi, 56(4), 695. | <i>chattonella, marina, separation, Separation of neurotoxins from Chattonella marina, neurotoxins</i> |
| 2315 | Onoue Y. and K. Nozawa. | 1989 | 毒 | PSP components toxified short-necked clams in Yamagawa Bay, Kagoshima Prefecture. | Nippon Suisan Gakkaishi, 55(5), 837–841. | prefecture, bay, toxified, clams, necked, PSP components toxified short-necked clams in Yamagawa Bay, Kagoshima Prefecture, components, kagoshima, yamagawa, short, psp |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2316 | Onoue Y. and K. Nozawa. | 1989 | 毒・シャットネラ・クロディウム | Separation of toxins from harmful red tides occurring along the coast of Kagoshima prefecture. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 371-374. | 毒/鹿児島県/赤潮 |
| 2317 | Onoue Y., K. Nozawa, K. Kumanda, K. Takeda, and T. Aramaki. | 1985 | クロディウム | Toxicity of <i>Cochlodinium</i> type '78 Yatsushiro occurring in Yatsushiro Sea. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 51(1), 147. | yatsushiro, toxicity of <i>Cochlodinium</i> type '78, occurring, cochlodinium, sea, toxicity, type, Yatsushiro occurring in Yatsushiro Sea |
| 2318 | Onoue Y., K. Nozawa, K. Kumanda, K. Takeda, and T. Aramaki. | 1985 | ミキモトイ | Occurrence of a toxic dinoflagellate, "Gymnodinium-type '84 K", in Kagoshima Bay. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 51(9), 1567. | K, in Kagoshima Bay, dinoflagellate, bay, occurrence, Gymnodinium-type '84, kagoshima, gymnodinium, type, toxic, occurrence of a toxic dinoflagellate |
| 2319 | 大森 信・池田 勉. | 1976 | 環境 | 動物プランクトン生態研究法. | 生態学研究法講座5, 共立出版, 229p. | 動物プランクトン生態研究法 |
| 2320 | Orellana M. V. and M. J. Perry. | 1992 | 環境 | An immunoprobe to measure Rubisco concentrations and maximal photosynthetic rates of individual phytoplankton cells. | Limnology and Oceanography, 37(3), 478-490. | An immunoprobe to measure Rubisco concentrations and maximal photosynthetic rates of individual phytoplankton cells, rubisco, individual, cells, phytoplankton, photosynthetic, rates, concentrations, maximal, immunoprobe, measure |
| 2321 | Orellana-Cepeda E., E. Martínez-Romero, L. Muñoz-Cabrera, P. López-Ramírez, E. Cabrera-Mancilla, and C. Ramírez-Camarena. | 1998 | バハマセ | Toxicity associated with blooms of <i>Pyrodinium bahamense</i> var. <i>compressum</i> in southwestern Mexico. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 60. | <i>Pyrodinium bahamense</i> /赤潮/毒性/メキシコ |
| 2322 | 折田和三. | 1998 | 赤潮一般 | 鹿児島県における赤潮発生状況. | 日本プランクトン学会誌, 45(1), 32-35. | 赤潮/鹿児島湾/ <i>Chattonella marina</i> |
| 2323 | Orlova T., M. S. Selina, and I. V. Stonik. | 1998 | 赤潮一般 | Distortion of harmful microalgae in Peter the Great Bay, the Sea of Japan, Russia. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 86-87. | ロシア/日本海/有害/分布 |
| 2324 | Orlova T. Y., N. V. Zhukova, and I. V. Stonik. | 1996 | 珪藻 | Bloom-forming diatom <i>Pseudonitzschia pungens</i> in Amurskii Bay (the sea of Japan): Morphology, ecology and biochemistry. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 147-150. | <i>Pseudonitzschia pungens</i> /日本海/ロシア |
| 2325 | Orozco F. E. and J. I. Carreto. | 1989 | アレキサンドリウム | Distribution of <i>Alexandrium excavatum</i> resting cysts in a patagonic shelf area (Argentina). | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 309-312. | <i>Alexandrium excavatum</i> /シスト/アルゼンチン |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2326 | Oshima Y. | 1995 | 毒 | Post-column derivatization HPLC methods for paralytic shellfish poisons. | Manual on Harmful Marine Microalgae, 81–94. | HPLC/PSP |
| 2327 | 大嶋雄治. | 2000 | 環境 | 有機錫による魚類の内分泌かく乱. | Biomedical Research on Trace Elements, 11(4), 321–322. | 有機錫, 内分泌かく乱, 魚類 |
| 2328 | Oshima Y., S. I. Blackburn, and G. M. Hallegraeff. | 1993 | カテナータム | Comparative study on paralytic shellfish toxin profiles of the dinoflagellate <i>Gymnodinium catenatum</i> from three different countries. | Marine Biology, 116(3), 471–476. | toxin, study, shellfish, dinoflagellate, comparative, paralytic, countries, profiles, gymnodinium, different, three, catenatum, Comparative study on paralytic shellfish toxin profiles of the dinoflagellate Gymnodinium catenatum from three different countries |
| 2329 | 大島泰克・濱野米一. | 2007 | 毒 | 麻痺性貝毒のモニタリング. | 貝毒研究の最先端－現状と展望(今井一郎, 福代康夫, 広石伸互編)恒星社厚生閣, 東京, 19–29. | 麻痺性貝毒, モニタリング |
| 2330 | Oshima Y., T. Hayakawa, M. Hashimoto, T. Yasumoto, and K. Kotaki. | 1982 | アレキサンドリウム | Classification of <i>Protogonyaulax tamarensis</i> from northern Japan into three strains by toxin composition. | Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish., 48(6), 851–854. | toxin, Classification of <i>Protogonyaulax tamarensis</i> from northern Japan into three strains by toxin composition, strains, composition, japan, protogonyaulax, classification, northern, three, tamarensis |
| 2331 | 大嶋雄治・本城凡夫. | 2000 | スズ | III. 水生生物の内分泌系に及ぼす影響の実験的検証 7. 淡水魚. | 水産学シリーズ, 126, 87–96. | 影響, 水生生物, 内分泌系, 淡水魚, 実験的検証 |
| 2332 | 大嶋雄治・本城凡夫. | 2002 | 環境 | メダカの行動を用いた水質の生物センサー -3次元行動解析による水質の監視-. | エンバイオ, 45–47. | メダカ, 行動解析, 生物センサー, 監視, 行動, 水質 |
| 2333 | 大嶋雄治・本城凡夫・小林邦男. | 1998 | スズ | 環境中のホルモン様活性物質による複合汚染 ヒメダカを用いて行った実験結果は何を物語るか. | 化学と生物, 36(7), 418–419. | 実験, ヒメダカ, 複合汚染, ホルモン, 活性物質, 環境 |
| 2334 | 大嶋雄治・堀 就英・井上 英・橋本伸哉・仲山 廉・島崎洋平・甲斐徳久・本城凡夫. | 2008 | その他 | 粉碎脱水法による魚肉からの Co-PCBs の除法. | 九大農学芸誌, 63(1), 41–45. | 魚肉, 除法, pcbs, 粉碎脱水法, Co-PCBs |
| 2335 | 大嶋雄治・井上 英・島崎洋平・仲山 廉・本城凡夫. | 2003 | スズ | 沿岸域におけるトリプチルスズ汚染の現状と魚介類への影響. | 海洋と生物 144, 25(1), 11–14. | Tributyltin/pollution/fish and shellfish/coastal area |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2336 | Oshima Y., H. Itakura, K. C. Lee, T. Yasumoto, S. Blackburn, and G. Hallegraeff. | 1993 | カテナータム | Toxin production by the dinoflagellate <i>Gymnodinium catenatum</i> . | Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, T. J. Smayda and Y. Shimizu, editors, 907–912. | <i>Gymnodinium catenatum</i> /渦鞭毛藻/毒 |
| 2337 | Oshima Y., I. J. Kang, M. Kobayashi, K. Nakayama, N. Imada, and T. Honjo. | 2003 | スズ | Suppression of sexual behavior in male Japanese medaka (<i>Oryzias latipes</i>) exposed to 17 β -estradiol. | Chemosphere, 50, 429–436. | Japanese medaka/17 β -Estradiol/Sexual behavior assay/Endocrine disruption |
| 2338 | 大嶋雄治・姜 益俊・島崎洋平・仲山 延・羽野健志・本城凡夫. | 2004 | スズ・環境 | III. 脊椎動物 6. メダカ. | 微量人工化学物質の生物モニタリング, 水産学シリーズ, 140, 94–104. | メダカ, 脊椎動物 |
| 2339 | Oshima Y., K. Kobayashi, L. Fachrudin, and N. Ishida. | 1996 | 環境 | Effect of the induced drug-metabolizing enzyme activity on the duration of oxolinic acid in fish. | Marine Environmental Research, 42(1–4), 335–338. | oxolinic, effect, fish, activity, drug, metabolizing, induced, duration, enzyme, acid, Effect of the induced drug-metabolizing enzyme activity on the duration of oxolinic acid in fish |
| 2340 | 大嶋雄治・小山次郎・本城凡夫. | 2004 | 環境 | バイオマーカーによる沿岸生物への石油汚染のモニタリング. | 水産学シリーズ, 145, 109–119. | 石油汚染, バイオマーカー, 沿岸生物, モニタリング |
| 2341 | Oshima Y., J. Koyama, K. Nakayama, Y. Inoue, Y. Shimasaki, S. Inoue, and T. Honjo. | 2004 | スズ | Use of hepatic CYP1A1 activity in Japanese flounder to monitor oil dispersed from the <i>Nakhodka</i> spill. | 環境毒性学会誌, 7(2), 123–129. | oil pollution/biomarker/flounder/CYP1A1 |
| 2342 | Oshima Y., H. Minami, Y. Takano, and T. Yasumoto. | 1989 | 淡水赤潮 | Ichthyotoxins in a freshwater dinoflagellate <i>Peridinium polonicum</i> . | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 375–378. | <i>Peridinium polonicum</i> /渦鞭毛藻/淡水度/魚類/毒 |
| 2343 | Oshima Y., K. Nakayama, T. Hano, S. G. Kim, Y. Shimasaki, I. J. Kang, and T. Honjo. | 2009 | 環境 | Toxic interactions between tributyltin and polychlorinated biphenyls in aquatic organisms. | Environmental Impact of Antifouling Biocides, 195–205. | biphenyls, organisms, tributyltin, aquatic, interactions, polychlorinated, toxic, Toxic interactions between tributyltin and polychlorinated biphenyls in aquatic organisms |
| 2344 | Oshima Y., K. Nirmala, J. Go, Y. Yokota, J. Koyama, N. Imada, T. Honjo, and K. Kobayashi. | 1997 | スズ | High accumulation of tributyltin in blood among the tissues of fish and applicability to environmental monitoring. | Environmental Toxicology and Chemistry, 16(7), 1515–1517. | Tributyltin contamination/Blood accumulation/Marine fishes |
| 2345 | Oshima Y., K. Nirmala, Y. Yokota, J. Go, Y. Shimasaki, M. Nakao, R. F. Lee, N. Imada, T. Honjo, and K. Kobayashi. | 1998 | スズ | Accumulation of tributyltin (TBT) in the blood of flounder and dab intraperitoneally administered with TBT. | Marine Environmental Research, 46, 587–590. | Accumulation of tributyltin (TBT) in the blood of flounder and dab intraperitoneally administered with TBT, intraperitoneally, tributyltin, administered, flounder, tbt, dab, accumulation, blood |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2346 | 大嶋雄治・K. Nirmala・横田佳子・島崎洋平・郷 譲治・今田信良・本城凡夫・小林邦男. | 1998 | スズ | トリプチルスズ(TBT)の魚類血液への蓄積とTBT-PCB複合汚染による産卵・ふ化への影響. | 環境毒性学会誌, 1(1), 26-35. | TBT/PCB/medaka/synergy/reproduction |
| 2347 | 大嶋雄治・K. Nirmala・横田佳子・島崎洋平・井上 英・仲山 慶・今田信良・本城凡夫・小林邦男. | 1999 | スズ | トリプチルスズ(TBT)の魚類血液への蓄積とTBT-PCB複合汚染による産卵・ふ化への影響. | 日本海水学会誌, 53(4), 224-228. | 産卵, 魚類血液, 影響, ふ化, 蓄積, トリプチルスズ(TBT), pcb, tbt, TBT-PCB複合汚染 |
| 2348 | 大嶋雄治・島崎洋平・本城凡夫. | 2005 | スズ | 有機スズ化合物汚染の Hot spot と海産生物への影響. | 日本マリンエンジニアリング学会誌, 40(1), 32-34. | Hot spot, 影響, 有機スズ化合物汚染, 海産生物, spot, hot |
| 2349 | 大嶋雄治・島崎洋平・井上 英・仲山 慶・本城凡夫. | 2003 | 環境・スズ | トリプチルスズとPCBsと水産生物. | Endocrine Disrupter NEWS LETTER, 6, 6. | トリプチルスズ, pcbs, 水産生物, PCBs |
| 2350 | Oshima Y., Y. Shimasaki, S. Inoue, K. Nakayama, and T. Honjo. | 2004 | 環境 | Effect of tributyltin on reproduction of bivalves and fish. | Paints Mar. Environ., 124-132. | reproduction, bivalves, effect, fish, tributyltin, Effect of tributyltin on reproduction of bivalves and fish |
| 2351 | Oshima Y., K. Sugino, H. Itakura, M. Hirota, and T. Yasumoto. | 1990 | 毒 | Comparative studies on paralytic shellfish toxin profile of dinoflagellates and bivalves. | Toxic Marine Phytoplankton, 391-396. | PSP/渦鞭毛藻/二枚貝 |
| 2352 | Oshima Y., T. Takeda, S. Katayama, Y. Inoue, S. Inoue, K. Nakayama, Y. Shimasaki, and T. Honjo. | 2004 | スズ | Relationship between temperature and pharmacokinetic parameters of florfenicol in carp (<i>Cyprinus carpio</i>). | 環境毒性学会誌, 7(2), 61-68. | pharmacokinetics/oxygen consumption/temperature/florfenicol/crap |
| 2353 | Oshima Y., S. Yamada, K. Matsunaga, T. Moriya, and Y. Ohizumi. | 1994 | 赤潮一般 | A monogalactosyl diacylglycerol from a cultured marine dinoflagellate, <i>Scrippsiella trochoidea</i> . | J. Nat. Prod., 57(4), 534-536. | trochoidea, A monogalactosyl diacylglycerol from a cultured marine dinoflagellate, Scrippsiella trochoidea, dinoflagellate, scrippsiella, marine, monogalactosyl, diacylglycerol, cultured |
| 2354 | Oshima Y. and T. Yasumoto. | 1979 | アレキサンドリウム | Analysis of toxins in cultured <i>Gonyaulax excavata</i> cells originating in Ofunato Bay, Japan. | Toxic Dinoflagellate Blooms, 377-380. | <i>Gonyaulax excavata</i> /大船渡湾/毒 |
| 2355 | Osterhaus A. D. | 1988 | 環境 | Seal death. | Nature, 334(6180), 301-302. | seal, death, Seal death |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2356 | Osterhaus A. D. M. E. and E. J. Vedder. | 1988 | 環境 | Identification of virus causing recent seal deaths. | Nature, 335(6185), 20. | seal, deaths, identification, Identification of virus causing recent seal deaths, causing, virus, recent |
| 2357 | 乙竹岩造. | 1950 | アコヤガイ・赤潮一般 | 御木本幸吉. | 大日本雄弁会講談社. | 御木本幸吉 |
| 2358 | 大内 晟. | 1984 | 赤潮一般 | 判別分析による赤潮予知. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(10), 1647–1651. | 赤潮予知, 判別分析 |
| 2359 | 大内 晟. | 1984 | 赤潮一般 | 広島湾の赤潮予察システムについて. | 広島県水産試験場研究報告, 14, 31–38. | 広島湾, 赤潮予察システム |
| 2360 | 大内 晟. | 1986 | 赤潮一般 | フーリエ解析と重回帰モデルを用いた赤潮シミュレーション. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 52(2), 203–207. | 回帰モデル, フーリエ解析, 赤潮シミュレーション |
| 2361 | Ouchi A., S. Aida, T. Uchida, and T. Honjo. | 1994 | ミキモトイ | Sexual reproduction of a red tide dinoflagellate <i>Gymnodinium mikimotoi</i> . | Fisheries Science, 60(1), 125–126. | <i>Gymnodinium mikimotoi</i> /sexual reproduction/red tide dinoflagellate/life cycle |
| 2362 | 大内 晟・楠木 豊・高山晴義. | 1983 | 珪藻 | 珪藻赤潮の重回帰式と海域区分について. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 49(6), 867–873. | 珪藻赤潮, 回帰式, 海域区分 |
| 2363 | 大内 晟・高山晴義. | 1984 | ミキモトイ | 赤潮図による <i>Gymnodinium</i> '65年型種赤潮の予察について. | Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries, 50(7), 1201–1205. | <i>Gymnodinium</i> '65, 予察, 赤潮図, <i>gymnodinium</i> , 型種赤潮 |
| 2364 | Oudra B., M. Loudiki, B. Sbiyyaa, V. Vasconcelos, H. Zerrouk, M. El-Andalousi-Dadi, and J. Darley. | 1998 | 淡水赤潮 | Occurrence of hepatotoxic <i>Microcystis aeruginosa</i> waterblooms in a eutrophic Moroccan lake reservoir. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 29–31. | <i>Microcystis aeruginosa</i> /赤潮/湖 |
| 2365 | Owens L. D. | 1969 | 毒 | Toxins in plant disease: Structure and mode of action. | Science, 165(3888), 18–25. | mode, disease, Toxins in plant disease, structure and mode of action, toxins, plant, structure, action |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2366 | Paasche E. | 1973 | 珪藻 | Silicon and the ecology of marine plankton diatoms. II. Silicate-uptake kinetics in five diatom species. | Marine Biology, 19(3), 262–269. | kinetics, uptake, marine, plankton, species, diatoms, diatom, ecology, silicon, Silicon and the ecology of marine plankton diatoms Silicate-uptake kinetics in five diatom species, silicate, five |
| 2367 | Padilla G. M., Y. S. Kim, and D. F. Martin. | 1975 | ミキモトイ | Separation and analysis of toxins isolated from a red-tide sample of <i>Gymnodinium breve</i> . | The First International Conference on Toxic Dinoflagellate Blooms, 299–308. | <i>Gymnodinium breve</i> /赤潮/毒/分類 |
| 2368 | Padilla G. M., Y. S. Kim, E. J. Rauckman, and G. M. Rosen. | 1979 | ミキモトイ | Physiological activities of toxins from <i>Gymnodinium breve</i> isolated by high performance liquid chromatography. | Toxic Dinoflagellate Blooms, 351–354. | <i>Gymnodinium breve</i> /毒/生理活性/高速液体クロマトグラフィー |
| 2369 | Padmakumar K. B., M. G. Sanilkumar, A. V. Saramma, and N. R. Menon. | 2007 | 珪藻 | A 'red tide' caused by the diatom <i>Coscinodiscus</i> on the southwest coast of India. | Harmful Algae News, 35, 14. | india, caused, red tide, tide, coast, caused by the diatom Coscinodiscus on the southwest coast of India, red, diatom, southwest, coscinodiscus, A |
| 2370 | Pagenkopf J. R., M. R. Morton, A. Stoddard, and E. D. Santoro. | 1989 | ブラウンタイプ | Water quality monitoring and modeling for the Peconic Bay BTCAMP. | Novel Phytoplankton Blooms, 761–778. | 水質モニタリング/モデル |
| 2371 | Pagou K. and L. Ignatiades. | 1990 | ミキモトイ | The periodicity of <i>Gymnodinium breve</i> (Davis) in Saronicos Gulf, Aegean Sea. | Toxic Marine Phytoplankton, 206–208. | <i>Gymnodinium breve</i> /同期性/エーゲ海/サロニコス湾 |
| 2372 | Palma A. S., M. G. Vilarinho, and M. T. Moita. | 1998 | ディノフィシス | Interannual trends in the longshore distribution of <i>Dinophysis</i> off Portuguese coast. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 124–127. | <i>Dinophysis</i> /ポルトガル/分布 |
| 2373 | Pan Y. and A. D. Cembella. | 1998 | プロロセントラム | Flow cytometric determination of cell cycles and growth rates of <i>Prorocentrum</i> spp. | Harmful Algae, B. Reguera, J. Blanco, M. L. Fernández, and T. Wyatt, Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 173–176. | <i>Prorocentrum</i> spp./細胞周期/増殖速度/フローサイトメーター |
| 2374 | Pan Y., D. V. Subba Rao, K. H. Mann, W. K. W. Li, and R. E. Warnock. | 1993 | 珪藻 | Temperature dependence of growth and carbon assimilation in <i>Nitzschia pungens</i> f. <i>multiseries</i> , the causative diatom of domoic acid poisoning. | Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, T. J. Smayda and Y. Shimizu, editors, 619–624. | <i>Nitzschia pungens</i> f. <i>multiseries</i> /温度/増殖/炭素/ドウモイ酸/毒 |
| 2375 | Pan Y., D. V. Subba Rao, and R. E. Warnock. | 1991 | 珪藻 | Photosynthesis and growth of <i>Nitzschia pungens</i> f. <i>multiseries</i> Hasle, a neurotoxin producing diatom. | J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 154(1), 77–96. | age/batch culture/culture age/growth/high light/low light/mass balance/ <i>Nitzschia pungens</i> f. <i>multiseries</i> /photosynthetic photon flux density(PPFD) |

| 番号 | 著者名 | 発行年数 | ジャンル | 題名 | 文献名・巻号・ページ | キーワード |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2376 | Park J. S. | 1982 | 赤潮一般 | Studies on the characteristics of red tide and environmental conditions in Jinhae Bay. | Bull. Fish. Res. Dev. Agency., 28, 55–88. | jinhae, conditions, tide, characteristics, bay, Studies on the characteristics of red tide and environmental conditions in Jinhae Bay, red, environmental, studies |
| 2377 | Park J. S. | 1991 | 赤潮一般 | Red tide occurrence and countermeasure in Korea. | Recent Approaches on Red Tide., 1–24. | korea, tide, occurrence, countermeasure, red, Red tide occurrence and countermeasure in Korea |
| 2378 | Park H. D., C. Iwami, M. F. Watanabe, K. Harada, T. Okino, and H. Hayashi. | 1996 | 淡水赤潮 | Seasonal changes of toxic <i>Microcystis</i> and amount of microcystin in Lake Suwa, Japan. | Harmful and Toxic Algal Blooms, Yasumoto, T., Oshima, Y., and Fukuyo, Y. (Eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 555–558. | <i>Microcystis</i> /毒/季節変化/諏訪湖/ミクロシチン |
| 2379 | Park J. G., M. K. Jeong, J. A. Lee, K.-J. Cho, and O.-S. Kwon. | 2001 | コクロディニウム | Diurnal vertical migration of a harmful dinoflagellate, <i>Cochlodinium polykrikoides</i> (Dinophyceae), during a red tide in coastal waters of Namhae Island, Korea. | Phycologia, 40(3), 292–297. | waters, korea, tide, dinoflagellate, cochlodinium, harmful, coastal, island, diurnal, red, dinophyceae, vertical, Diurnal vertical migration of a harmful dinoflagellate, <i>Cochlodinium polykrikoides</i> (Dinophyceae), during a red tide in coastal waters of Namhae Island, Korea, namhae, polykrikoides, migration |
| 2380 | Park J. S., H. G. Kim and S. G. Lee. | 1989 | 赤潮一般 | Studies on red tide phenomena in Korean coastal waters. | Red Tides Biology, Environmental Science, and Toxicology, Okaichi, Anderson, and Nemoto, Editors, 37–40. | 韓国/赤潮 |
| 2381 | Park J. H., I. Yoshinaga, T. Nishikawa, and I. Imai. | 2010 | シャットネラ | Algicidal bacteria in particleassociated from and in free-living from during a diatom bloom in the Seto Inland Sea, Japan. | Aquat. Microb. Ecol., 60, 151–161. | algicidal bacteria/particle-associated bacteria/free-living bacteria/harmful algal bloom |
| 2382 | Parkhill J. P. and A. D. Cembella. | 1999 | アレキサンドリウム | Effects of salinity, light and inorganic nitrogen on growth and toxicogenicity of the marine dinoflagellate <i>Alexandrium tamarense</i> from northeastern Canada. | J. Plankton Res., 21(5), 939–955. | canada, light, Effects of salinity, light and inorganic nitrogen on growth and toxicogenicity of the marine dinoflagellate <i>Alexandrium tamarense</i> from northeastern Canada, tamarense, dinoflagellate, marine, alexandrium, inorganic, toxicogenicity, growth, northeastern, effects, salinity, nitrogen |
| 2383 | Parkin T. B. and T. D. Brock. | 1980 | 環境 | The effects of light quality on the growth of phototrophic bacteria in lakes. | Arch. Microbiol., 125(1–2), 19–27. | photosynthetic sulfur bacteria/light quality/photosynthetic rates |
| 2384 | Parrish C. C., G. Bodennec, and P. Gentien. | 1998 | 赤潮一般 | Haemolytic glycoglycerolipids from <i>Gymnodinium</i> species. | Phytochemistry, 47(5), 783–787. | <i>Gymnodinium mikimotoi</i> / <i>Gymnodinium</i> cf. <i>nagasakiense</i> / toxic dinoflagellates/lipids/fatty acids/haemolytic activity |
| 2385 | Parrow M. W., H. B. Glasgow, J. M. Burkholder, and C. Zhang. | 2001 | フェステリア | Comparative response to algal prey by <i>Pfiesteria piscicida</i> , <i>Pfiesteria shumwayae</i> and an estuarine 'lookalike' species. | Harmful Algal Blooms 2000 Hallegraeff, G. M., Blackburn, S. I., Bolch, C. J. and Lewis, R. J. (eds) Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO 2001, 101–104. | <i>Pfiesteria piscicida</i> / <i>Pfiesteria shumwayae</i> / 餌 |